

Subgen. II. LEPIDORRHACHIS W. et D.

Clinostigma Mooreanum W. et D. — Isola Lord Howe.

»	<i>Deplanchei</i> (<i>Cyphokentia</i> Ad. Brong.)	—	Nuova Caledonia.
»	<i>eristachys</i>	”	”
»	<i>Billardieri</i>	”	”
»	<i>surculosa</i>	”	”
»	<i>vaginata</i>	”	”

Specie escluse dal genere KENTIA.

- K. Belmoreana* Moore et Muell. = *Howea (Grisebachia* W. et D.) *Belmoreana* Becc.
 » *Deplanchei* Ad. Brong. et Gris. = *Clinostigma (Cyphokentia* Ad. Brong.) *Deplanchei* Becc.
 » *Forsteriana* Moore et Muell. = *Howea (Grisebachia* W. et D.) *Forsteriana* Becc.
 » *gracilis* Ad. Brong. et Gris. = *Clinostigma (Cyphokentia* Ad. Brong.) *gracilis* Becc.
 » *Johannis* F. v. Muell. = *Veitchia Johannis* Wendl.
 » *macrocarpa* Vieill. (in Br. et Gr. l. c.) = *Kentiopsis macrocarpa* Ad. Brong.
 » *macrostachya* Panch. (in Br. et Gr. l. c.) = *Clinostigma (Cyphokentia* Ad. Brong.) *macrostachya* Becc.
 » *monostachya* F. v. Muell. = *Linospadix monostachyos* W. et D.
 » *Mooreana* F. v. Muell. = *Clinostigma Mooreana* W. et D.
 » *olivaformis* Ad. Brong. et Gris. = *Kentiopsis olivaformis* Ad. Brong.
 » *Pancheri* Ad. Brong. et Gris. = *Clinostigma (Cyphokentia* Ad. Brong.) *Pancheri* Becc.
 » *paradoxa* Mart. = *Nengella paradoxa* Becc. = *Opiphora*
 » *polystemon* Panch. (in Br. et Gr. l. c.) = *Kentiopsis divaricata* Ad. Brong.
 » *Storckii* F. v. Muell. = *Veitchia Storckii* Wendl.
 » *subglobosa* F. v. Muell. = *Veitchia subglobosa* Wendl.

Specie dubbia.

Kentia oleracea Seem. Fl. Vit. p. 269. . . = *Areca oleracea* Forst. Prodr. n. 488. — Nuove Ebridi.

Genus V. DRYMOPHLCEUS Blume.

Spadices infrafoliacei simpliciter ramosi. Spathae 2, exterior tubulosa bicristata. Flores glomerulato-terni, spiraliter vel distiche dispositi, versus apicem ramorum, abortu floris feminei, biflori. Fl. masc. sepala imbricata; stamina plurima, filamentis in alabastro haud inflexis, antheris versatilibus; ovarii rudimentum majusculum. Fl. fem. petala imbricata; staminum rudimenta parva; ovarium uniloculare, uniovulatum, ovulo parietali. Fructus ellipsoidei vel subglobosi; mesocarpio fibroso, endocarpio tenuissimo vel crustaceo; stigmatum residua apicalia. Semen sulcatum vel esulcatum; raphe ramis plurimis verticaliter descendantibus laxe anastomosantibus; albumen æquabile. Palmæ Moluccanæ et Papuanæ humiles. Frondes longe vaginantes æqualiter vel interrupte pinnatisectæ segmentis ad apicem præmorsis, nervis prim. infer. validis marginantibus.

Osservazioni. — Il genere è caratterizzato da un abito suo speciale, che per la forma dei segmenti delle foglie rammenta spesso quello delle *Caryotideæ*. Difatto però esso non differisce dal genere *Ptychosperma* che per l'omogeneità del suo albumen. Le specie del sottogenere *Actynophloeus* sarebbero dei *Ptychosperma* tipici, se pos-