

9. **L. anomala** Becc. sp. n. — Gracilis. Foliorum lamina cuneato-flabellata, vix divisa, segmento centrali profunde bifido, costulis inferioribus rubiginose furfuraceis. Spadix brevis, inflorescentiis partialibus ovatis, parvis, densifloris; spathis tubulosis subinflatis, laxissime vaginantibus, spisse rigideque chartaceis, apice truncatis, extus furfuraceo tomentellis; ramulis floriferis brevibus. Flores breviter pedicellati, 4 mm. longi, 2,5 mm. in medio lati; calyce late campanulato, basi abrupte angustato et subpedicellato, subtiliter membranaceo, trilobo, lobis saepe laceris; corolla carnosa, calyce circiter  $\frac{1}{3}$  longiori, cum inaperta 3-gono-pyramidata, segmentis elongato-triangularibus, intus conspicue alveolatis; urceolo staminali crasso, in 3 lobos primarios partito, lobis profunde emarginatis; staminibus biseriatis, filamentis subulatis; antheris late lineari-oblongis, utrinque rotundatis.

Nuova Guinea olandese meridionale, raccolta nell'anno 1909 a circa 750 m. di altezza da Von Römer, durante la spedizione del dott. Lorentz.

Specie molto distinta e singolare per le sue foglie indivise o quasi, per il corto spadice con piccola pannocchia terminale e per i fiori pedicellati.

10. **L. Muellerii** H. Wendl. et Dr. in *Linnaea*, XXXIX, 191, t. 3, f. 2. — *L. Ramsayi* F. v. Muell. *Fragm.* VIII, 221.

Australia: Bloomfield River, Dalrymple Gap. e Rockingham Bay in Nord Queensland.

11. **L. Lauterbachii** Damm. et K. Schum. in K. Schum. et Laut. *Fl. deut. Schutzg.* in d. Südsee (1901) 199. — *L. robusta* Warb. (nomen) in K. Schum. et Laut. l. c. — *L. Peckelii* Laut. in *Engl. Bot. Jahrb.* XLV (1911) 356.

Nuova Guinea boreo-orientale: nella Kaiser Wilhelmsland e nel Nuovo Mecklenburg a Namatanai.

**L. Lauterbachii** var. **bougainvillensis** Becc. — *L. Muellerii* (non W. et Dr.) Becc. in *Rechinger Bot. u. Zool. Ergebn.* p. V (1913) 61 (extr.).

Nell'Isola Bougainville a Kieta.

12. **L. Rumphii** Bl. *Rumphia*, II, 41 (excl. t. 89, f. 2?).  
Celebes e Molucche.