

floriferis 10-12 cm. longis, minute furfuraceis. Flores juxta ramulos crebre alternati, solitarii, sessiles, circ. 4 mm. longi, 1,5 mm. crassi, coriacei, glabri; calyce cyathiformi, truncato et breviter 3-dentato; corolla quam calyx subdupo longiori; annulo staminali conspicue elevato, filamentis a base lata abrupte setaceis, aequalibus, coronato. Fructus sphaericus, 9 mm. diam., periantio tereti, subpedicelliformi, suffultus.

Nuova Guinea boreo-orientale ad Etappenberg, a circa 650 m. di altezza, (*Ledermann*, n.^o 8900, nell'Erb. di Berlino; raccolta durante la « Kaiserin Augusta Fluss Expedition » del 1912).

65. **L. Kingiana** Becc., Malesia, III, 193.

Penisola malese a Goping nel Distretto di Perak. Erbario di Calcutta, n.^o 471 (esemplare tipico). *Ridley* (Mat. Fl. Mal. Penins. II, 165) indica altre località in Perak di questa specie, che sembra poco comune.

66. **L. tonkinensis** Becc. in *Webbia*, III (1910) 214.

Nel Tonkino occidentale a Vo-xa (Padre *Bon*, n.^o 2091 nell'Erb. di Parigi).

67. **L. spicata** Becc. Malesia, III, 88, t. 8.

Borneo: in Sarawak presso Kuching, ai piedi del M. Mattang (Becc. P. B., n.^o 1834).

68. **L. mattanensis** Becc., Malesia, III, 86.

Borneo in Sarawak: sul M. Mattang presso Kuching. (Becc. P. B., n.^o 2044, 2568).

L. mattanensis Becc. var. **paucisecta** Becc. v. n. — A forma typica differt foliorum lamina in segmentos paucos (9) divisa; segmento mediano anguste lineari, 1-costulato; segmento medio 3-6-costulato, 4-5 cm. lato, superne, paullo infra apicem, angustato, segmentis exterioribus angustis et acuminatis.

Borneo in Sarawak: Jambusan presso Kuching (*Ridley*, n.^o 12400. Erb. di Kew).

69. **L. Hallieriana** Becc. sp. n. — Parva, caudice toruloso, prostrato-ascendenti subtus radicanti, digitis minoris crassitiae. Foliorum petiolus 12-30 cm. longus, subinermis; la-

minae segmenta pauca (6-8), inaequalia, linear-lanceolata, in medio latiora quam ad extremitates; centralia 20-22 cm. longa, 2-3,5 cm. lata, 1-4-costulata, apice breviter obtuseque lobata et lobulata; segmenta lateralia breviora ac angustiora, lobis apicalibus longioribus. Spadices parvi, simplicissimi, petiolis valde breviores, circ. 15 cm. longi, parte pedunculari (spathis duabus complanatis induta) in spicam parvam, 5-6 cm. longam et floribus pluriseriatis onustam, continuata. Flores juniores ovati, 3 mm. longi, solitarii, sessiles; calyce membranaceo, papilloso-puberulo; corolla glabra, lobis, praecipue ad apicem, spissis; annulo staminali brevi, filamentis a basi lata abrupte subulatis, aequalibus, coronato; ovario turbinato, stylo a basi conica subulato.

Borneo olandese ad Amai Ambit (*Hallier* n.^o 3374 nell'Erb. di Buitenzorg; raccolta durante la spedizione olandese in Borneo del 1893-94).

70. **L. simplex** Becc. — *Dammera simplex* Laut. et K. Schum. Fl. Deutsch. Schutzg. in der Südsee (1900) 201.

Nuova Guinea boreo-orientale: in luoghi padulosi lungo il fiume Gogol (*Lauterbach*, n.^o 1536. Erb. di Berl.).

71. **L. ramosa** Becc. — *Dammera ramosa* K. Schum. et Laut., Fl. Deutsch. Schutzg. in der Südsee, 201.

Nuova Guinea boreo-orientale: nella parte superiore del corso del fiume Gogol (*Lauterbach*, n.^o 1147, nell'Erb. di Berlino).

SPECIE DELLE QUALI NON HO VISTO ESEMPLARI
E DI DUBBIA AFFINITÀ.

72. **L. grandiflora** Ridley in Trans. Linn. Soc. 2.^a ser., Bot. IX (1916) 233.

Nuova Guinea olandese meridionale, raccolta da *C. Boden* durante la spedizione Wollaston 1912-1913.

73. **L. Glossi** Ridley, l. c. 234.

Nuova Guinea olandese meridionale: come sopra.

74. **L. flavigena** Ridley, l. c. 234.

Nuova Guinea olandese meridionale: come sopra.