

Penisola malese : Distretto di Perak (*Scortechini*). Gunong Jerai in Kedah (*Ridley*, n.^o 5201. Erb. Beccari).

62. *L. borneensis* Becc., Malesia, III, 85, t. VI.

Borneo in Sarawak : sulle sponde del Tubao, nell'interno della prov. di Bintulu (Becc.).

63. *L. Wrayi* Becc. sp. n. — *Mediocris. Foliorum petiolus valde elongatus, prope basin tantum spinulosus ; laminae segmenta 8-10, cuneata, lobulis triangularibus, elongatis breviter fisis terminata ; segmento mediano 30-37 cm. longo, 9-11 cm. ad apicem lato, pluricostulato ; segmentis intermediis mediano minoribus et angustioribus, 3-5-costulatis, lobis apicalibus longioribus valde acuminatis praeditis. Spadices nutantes, parvi, ad apicem partis peduncularis (circ. 50 cm. longae, et spathis duabus tantum indutae) paniculam parvam, parce simpliciterque ramosam, ferentes ; spathis complanatis, laxe vaginantibus ; ramulis dense floriferis, crassiusculis, 8-10 cm. longis, tomentosulis. Flores sessiles, subcoriacei, ovati, acuti, 7 mm. longi ; calyce piloso; corolla quam calyx duplo longiori, lobis elongato-triangularibus, appresse pilosis ; annulo staminali nonnihil elevato, filamentis a base lata subulatis, aequalibus, coronato ; ovario glabro.*

Penisola malese : sul Gunong Bubu in Perak all'altezza di circa 1400 m., raccolta da *L. Wray Jr.* (n.^o 3918 nell'Erbario di Kew — esemplare tipico); sul Gunong Hijau pure in Perak, fra i 1200-1500 m. (*Curtis*, n.^o 3529, nell'Erb. di Kew).

64. *L. parviflora* U. Dammer, nomen in Herb. Berol. — *Mediocris, caudice brevi, crasso. Foliorum petiolus longiusculus, basi tantum vix spinulosus ; laminae segmenta numerosa ; intermedia circ. 40 cm. longa. 15 mm. lata, bicostulata, superne infra apicem paullo angustata et lobis angustis terminata ; segmento mediano latiori, ab apice, 25 mm. lato, deorsum attenuato-cuneato, 4-costulato, lobulis brevibus, obtusis, terminato. Spadices ad apicem partis peduncularis valde elongatae (usque ad 1,10 m. longae) et spathis duabus tantum indutae, paniculam parvam, parce simpliciter ramosam, ferentes ; spathis tubulosis, elongatis, compressis ; ramulis*

floriferis 10-12 cm. longis, minute furfuraceis. Flores juxta ramulos crebre alternati, solitarii, sessiles, circ. 4 mm. longi, 1,5 mm. crassi, coriacei, glabri; calyce cyathiformi, truncato et breviter 3-dentato; corolla quam calyx subdupo longiori; annulo staminali conspicue elevato, filamentis a base lata abrupte setaceis, aequalibus, coronato. Fructus sphaericus, 9 mm. diam., periantio tereti, subpedicelliformi, suffultus.

Nuova Guinea boreo-orientale ad Etappenberg, a circa 650 m. di altezza, (*Ledermann*, n.^o 8900, nell'Erb. di Berlino; raccolta durante la « Kaiserin Augusta Fluss Expedition » del 1912).

65. **L. Kingiana** Becc., Malesia, III, 193.

Penisola malese a Goping nel Distretto di Perak. Erbario di Calcutta, n.^o 471 (esemplare tipico). *Ridley* (Mat. Fl. Mal. Penins. II, 165) indica altre località in Perak di questa specie, che sembra poco comune.

66. **L. tonkinensis** Becc. in *Webbia*, III (1910) 214.

Nel Tonkino occidentale a Vo-xa (Padre *Bon*, n.^o 2091 nell'Erb. di Parigi).

67. **L. spicata** Becc. Malesia, III, 88, t. 8.

Borneo: in Sarawak presso Kuching, ai piedi del M. Mattang (Becc. P. B., n.^o 1834).

68. **L. mattanensis** Becc., Malesia, III, 86.

Borneo in Sarawak: sul M. Mattang presso Kuching. (Becc. P. B., n.^o 2044, 2568).

L. mattanensis Becc. var. **paucisecta** Becc. v. n. — A forma typica differt foliorum lamina in segmentos paucos (9) divisa; segmento mediano anguste lineari, 1-costulato; segmento medio 3-6-costulato, 4-5 cm. lato, superne, paullo infra apicem, angustato, segmentis exterioribus angustis et acuminatis.

Borneo in Sarawak: Jambusan presso Kuching (*Ridley*, n.^o 12400. Erb. di Kew).

69. **L. Hallieriana** Becc. sp. n. — Parva, caudice toruloso, prostrato-ascendenti subtus radicanti, digitis minoris crassitiae. Foliorum petiolus 12-30 cm. longus, subinermis; la-