

48. **L. celebica** Miq., De Palm. Arch. Ind. 11, 25, 33.
Celebes settentrionale: nella prov. di Minahassa (*Miquel*)
e nella parte S. E. presso Kandari (*Becc.*).

49. **L. glabra** Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. V, 329 et
Palms Brit. Ind. 124, t. CCXXIII. — *L. longepedunculata*
Ridl. in Journ. Roy. As. Soc. XLI, 42, et Mat. Fl. Mal.
Penins. II, 161.

Penisola malese, specialmente sulle montagne: M. Ophir
presso Malacca (*Griffith*); Gunong Ledang (*Ridley*, n. 3473);
Perak (*Scortechini*, n.º 593^b, 319^b, Erb. *Becc.*). Gunong Batu
puteh in Perak (*Ridley*, n.º 8140, questo è il tipo della
L. longepedunculata *Ridley*).

L. glabra var. **selangorensis** Becc. var. n. — Minor. Foliorum segmenta pauca (6-8), inaequalia, 3-pluricostulata, 15-20 cm. longa, segmento mediano latiori, profunde bifido. Spadices circ. 50 cm. longi, ramulis floriferis minute puberulis. Flores quam in forma typica angustiores et magis acuminati, fusiformes, 5 mm. longi, 1,5 mm. crassi. Fructus oblongus vel oblongo-ellipticus, 10 mm. longus, 7 mm. crassus.

Penisola malese: Ulu Semangko nello Stato di Selangore (*Ridley*, n.º 12117 nell'Erb. *Beccari*).

50. **L. arbuscula** Becc., Malesia, III, 79.

Borneo in Sarawak: sul M. Poe (*Becc. P. B.* n.º 2432),
sul M. Linga (*Hewitt*, Erb. di Kew).

51. **L. malayana** Becc., Malesia, III, 197.

Penisola malese: Salak hills in Perak (*Scortechini*, n.º 52^b
in Erb. *Becc.*, esemplare tipico con soli fiori); sulle colline
nel distretto di Goping in Perak (Erb. di Calcutta, n.º 8127,
esemplare fruttifero).

52. **L. modesta** Becc., Malesia, III, 195.

Penisola malese: sembra assai comune nel Distretto di
Perak, Maxwell's Hill (*Scortechini*), a Larut (Erb. di Cal-
cutta, nn. 3243, 2420, 1983, 1951, 1945).

53. **L. Robinsoniana** Becc. sp. n. — Mediocris. Foliorum
petiolus metralis, remote spinosus; laminae segmenta nu-
merosa (ad 15) subaequalia, linearia, intermedia et centralia
40 cm. longa, 2-3-costulata, 2-3 cm. lata, marginibus longe

producto-caudatis. Spadices paniculati, inflorescentis partibus numerosis, in 5-6 ramulos floriferos, pilosos divisis; spathis brevibus, nonnihil inflatis. Flores solitarii vel per paria approximati, super pulvinulos subpedicelliformes inserti, anguste ovideo-elliptici, subacuminati, 4 mm. longi, 2,5 mm. crassi; calyce campanulato, basi abrupte angustato, patule pilosulo, 3-lobo; corolla quam calyx duplo longiori, lobis elongato-lanceolatis, coriaceis, appresse pilosis, apicibus crassis; annulo staminali modice elevato, filamentis 6 aequalibus, a basi lata subulatis, coronato; antheris ovato-oblongis; ovario glabro, turbinato, stylo gracili subulato.

Indo-China: nelle grandi foreste dell'Annam nella pianura a Nha-trang (*C. B. Robinson*, n.^o 1400. Erb. di Manilla e Beccari).

54. **L. pumila** Reinw. in litt. (1824) ex Blume in Roem. et Schult. Syst. Veg. VIII, 1302 (1830), et Rumphia, II, 43, t. 91. — *L. gracilis* Bl. in Roem. et Sch. l. c. 1303, et Rumphia, II, 44, t. 87, 92. — *L. elegans* Bl., Rumphia, II, 42, t. 90? et Auct. plur.

Giava in Bantam.-Sumatra in Palembang ed in Lampung.

55. **L. nana** Bl., Rumphia, II, 46, t. 93.

Sumatra: Padang e Palembang.

56. **L. calciphila** Becc. in Webbia, III (1910).

Tonkino (*Balansa*, n.^o 436. Erb. di Parigi).

57. **L. orbicularis** Becc., Malesia, III (1886) 83. — *L. Veitchii* W. Watson, in Gard. Chr. (1886) I, 139 (nomen); Hook. f. in Bot. Magaz. (1888) t. 7053. — *Pritchardia grandis* Hort. Veitch (non Hort. Bull.).

Borneo in Sarawak: sul M. Mattang (Becc.).

58. **L. cordata** Becc., Malesia, III (1886) 84.

Borneo in Sarawak: Colline del Bellaga nell'Alto Rejang (Becc.).

59. **L. Micholitzii** Ridley in Gard. Chron. XXXV (1904) 50.

Borneo in Sarawak: sul M. Brooke (*Micholitz*. Non vidi).

60. **L. fatua** Becc. in Webbia, III (1910) 218.

Tonkino occidentale (*Père Bon*, n.^o 3130. Erb. di Parigi).

61. **L. Scortechinii** Becc., Malesia, III, 192.