

minae segmenta pauca (6-8), inaequalia, lineari-lanceolata, in medio latiora quam ad extremitates; centralia 20-22 cm. longa, 2-3,5 cm. lata, 1-4-costulata, apice breviter obtuseque lobata et lobulata; segmenta lateralia breviora ac angustiora, lobis apicalibus longioribus. Spadices parvi, simplicissimi, petiolis valde breviores, circ. 15 cm. longi, parte pedunculari (spathis duabus complanatis induta) in spicam parvam, 5-6 cm. longam et floribus pluriseriatis onustam, continuata. Flores juniores ovati, 3 mm. longi, solitarii, sessiles; calyce membranaceo, papilloso-puberulo; corolla glabra, lobis, praecipue ad apicem, spissis; annulo staminali brevi, filamentis a basi lata abrupte subulatis, aequalibus, coronato; ovario turbinato, stylo a basi conica subulato.

Borneo olandese ad Amai Ambit (*Hallier* n.° 3374 nell'Erb. di Buitenzorg; raccolta durante la spedizione olandese in Borneo del 1893-94).

70. **L. simplex** Becc. — *Dammera simplex* Laut. et K. Schum. Fl. Deutsch. Schutzg. in der Südsee (1900) 201.

Nuova Guinea boreo-orientale: in luoghi padulosi lungo il fiume Gogol (*Lauterbach*, n.° 1536. Erb. di Berl.).

71. **L. ramosa** Becc. — *Dammera ramosa* K. Schum. et Laut., Fl. Deutsch. Schutzg. in der Südsee, 201.

Nuova Guinea boreo-orientale: nella parte superiore del corso del fiume Gogol (*Lauterbach*, n.° 1147, nell'Erb. di Berlino).

SPECIE DELLE QUALI NON HO VISTO ESEMPLARI  
E DI DUBBIA AFFINITÀ.

72. **L. grandiflora** Ridley in Trans. Linn. Soc. 2.<sup>a</sup> ser., Bot. IX (1916) 233.

Nuova Guinea olandese meridionale, raccolta da *C. Boden* durante la spedizione Wollaston 1912-1913.

73. **L. Glossi** Ridley, l. c. 234.

Nuova Guinea olandese meridionale: come sopra.

74. **L. flavida** Ridley, l. c. 234.

Nuova Guinea olandese meridionale: come sopra.