

5. **L. tahanensis** Becc. sp. n. — Mediocris 7-8 m. alta. Folia regulariter multipartita, segmentis bifidis, laciniis acuminatis, rigidis; petiolo a basi usque ad apicem fortiter spinoso. Spadix circ. 1 m. longus, spathis primaris usque ad apicem arcte tubulosis, breviter bidentatis; paniculae ramis divaricatis, ramulis floriferis zig-zag sinuosis. Fructus globoso-ovatus, in vertice rotundatus, 15-17 mm. longus, 14-15 mm. diam., pedicelio disciformi, brevi, 1,5 mm. longo, 3 mm. lato suffultus; semine globoso, 1 cm. diam., integumentum processu curvulo, lobulato, profunde perfosso.

Penisola malese sul M. Tahan, Distretto di Pahang, a 1000 m. di altezza (*L. Wray* e *H. C. Robinson*, n.º 5355 nell'Erb. del Museo di Perak).

6. **L. Jenkinsiana** Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. V, 334 et Palms Brit. Ind. 128, t. 226 A-B.

N. E. India: Assam; Darjeeling.

7. **L. Woodfordii** Ridley in Gard. Chr. 1898, I, 177.

Isole Salomone (*Woodford*).

8. **L. Merrillii** Becc. in Perkins, Fragm. Fl. Philip. I, 45.

Isole Filippine in Luzon.

9. **L. rotundifolia** Mart. Hist. Nat. Palm. III, 241.

Diffusa nelle Molucche, in Celebes, in Giava e nelle Filippine.

L. rotundifolia Mart., forma typica.

Ceram nelle Molucche; Celebes; Giava.

L. rotundifolia var. **microcarpa** Becc. in Philip. Journ. Sci. XIV (1919) 339, 341.

Isole Filippine: Palawan.

L. rotundifolia var. **mindorensis** Becc. in Philip. Journ. Sci. XIV (1919) 339, 341.

Isole Filippine: Mindoro.

L. rotundifolia var. **luzonensis** Becc. in Philip. Journ. Sci. XIV (1919) 339, 340.

Isole Filippine: Luzon.

10. **L. Robinsoniana** Becc. in Philip. Journ. Sci., Botany, VI (1911) 230, et XIV (1919) 339, 341.

Isole Filippine: Polillo; Luzon.