

Subgenus II. **Orophoma** Spruce in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 171, Drude in Nat. Pff. III. II (1889) 43; — sub genere *Orophoma* Drude in Fl. Bras. III. II (1881) 294 (excl. *O. subinermi* [Spruce] Drude).

Stamina petalis anteposita cum iis inferne connata.
Frondis vagina superne in fibras densas dissoluta.

6. **Mauritia Carana** Wallace.

Diese Art ist in der Folge ganz falsch beschrieben worden. Vergleiche hierzu meine Bemerkungen in Notizbl. Bot. Gart. Berlin X (1929) 568. Es liegen mir außer Wedelstücken zwar abgefallene männliche Blüten vor, aber leider kein Kolbenast, dagegen Fruchtäste mit unreifen und reifen Früchten. Letztere sind groß, kugelig mit mahagonibraunen Schuppen.

Mauritiella Burret nov. gen. — *Mauritia* spec. auct.

Palmae flabelliformes. Caudex inter minus validos vel tenuiores, saepe curvatus, saepe plures ex eodem rhizomate caespitosi, radicibus aculeatis simplicibus armatus. Frondes subtus ceraceo-albo-pruinosa. Spadix rhachi et ramis distichis, simplicibus, spathis et spathellis praeditis. Dioici. Flores ♂ et ♀ in amentis parvis, ♂ in seriebus pluribus, ♀ plerumque distiche dispositi. Stamina 6, quorum 3 petalis opposita eorum basi breviter adnata. Fructus majores vel plerumque minores squamis flavido-brunneis. Embryo ad seminis basin situs.

Typus generis: *Mauritiella aculeata* (H. B. K.) Burret.

1. **Mauritiella aculeata** (H. B. K.) Burret nov. comb. — *Mauritia aculeata* H. B. K. Nov. Gen. et Spec. I (1815) 311.

Hierzu gehören als Synonyme *Mauritia gracilis* Wallace und *M. limnophila* Barb. Rodr. Vergleiche die Bemerkungen unter *Mauritiella Duckei*.

2. **Mauritiella Duckei** Burret nov. spec. — Frondis, ut videtur, nondum omnino adultae vagina apicem versus lanceolata, ad apicem et margines versus leviter producta, integra, in fibras haud dissoluta; petiolus supra vaginae apicem 35 cm longus, teres, glaber vel glabratus, apice 2 cm in diam. metiens. Lamina, ut videtur, suborbicularis, in parte fere centrali 75 cm longa, in pinnis marginalibus vix brevior, profunde divisa, in semiflabello quoque basi indivisa in dimidia parte 8 cm, in marginali 4 cm fere longa. Segmenta 60, anguste linearia, longe attenuata et acuminata, latiora usque 2,2 cm lata, omnia supra viridia, subtus ceraceo-albo-pruinosa, in costa media supra inermia, subtus paleis laciniatis fuscis praedita, ad