

**CATALOGO DAS SEMENTES A QUE SE REFERE A CARTA ANTECEDENTE**

N.º 1. Regio I (littoralis) (Phœnicacæ) Welw. Apont.  
Districto: Barra do Dande et Libongo.

*Hyphane coriacea* Gaertn.

Palma curiosissima, *trunco more Dracænæ Draconis* repetito dichotomo, coma sphaerica, foliis flabelliformibus fibras textiles prestantissimas præbentibus. Fructus edulis.

Habit. freq. in littore Oceani ex Ambriz usque Loanda.  
Fruct. matur. Sept. 1858 ad Dande. leg. W.

N.º 2. Regio II (Phœnicacæ)  
Districto: Golungo Alto.

*Raphia textilis* Welw. mspt.  
(Metroxilon textile W. olim).

Palma speciosa, foliorum pinnat. petiolis longis, foliis elongatis, filamenta textilia præbentibus, bacis ovato-ellipticis vertice obtusis. A *Raphia* vini-fera Flor. Nigrit. omnino *diversa* species.

Ad rivulos in Distr. Golungo Alto et Dembos.  
Fruct. bene matur. 1857. leg. W.

N.º 3. Regio I et II. 0—2:000 ped. altit supra Oceanum. (Phœnicacæ.)

Districto: Icolo et Bengo.

*Elaeis guineensis* Lin.!

Variet. *macrosperma* Welw. mspt. Nigritis—*Dihôhó!*

Palma egregia, monoica, coma formosa non raro caudicem 30 pedalem coronante, fructu flavo-aurantiaco, oleo diviti, ubique culta, excepta III regione, ubi ob noctes frigidas vix prosperat. Vinum jucundum largitur, *Maluvo* dictum, omnesque totius stirpis partes Nigritis in vita domestica utilissimæ.

Semina 1858 leg. W.

N.º 4. (Phœnicacæ.)

Districto: Icolo et Bengo.

*Elaeis guineensis* Lin.

Variet. *microsperma* Welw. Nigritis — *Dissombo!*

Palma spectabilis, monoica, *oleifera* et *vinum* optimum præbens, *indigena* et freq. culta.

Semina 1858 leg. W.

N.º 5. Regio II et III. 1:800—3:500 ped. altit. supra Oceanum. (Meliacæ.)

Districto: Pungo Andongo.

*Melia aethiopica* Welw. mspt.

Arbor pulchra, coma dilatata, foliis compositis ad *Melia Azederach* similibus maximis 2—3 1/2 pedibus, floribus albis fragrantissimis, fructu (*drupa*) pruni domestici more monopyrena, pyrena cylindrico-elliptica. Stirps egregia cultura dignissima! (Lignum fere *Cedrelacearum*!)

In sylvis Golungo Alto. 1857. leg. W.

N.º 6. Regio II.

Districto: Libongo inter Ambriz et Dande.

*Spathodea campanulata*. Pal. de Beauv. Flora Bennin.  
*Bignonia tulipifera* Schum. et Thon. Plant. guineenses etc.

Arbor mediocris, habitu *Fraxini*, et dum floret ex pulcherrimis totius Africae tropicæ!

Folia pinnata, intense viridia; flores racemoso-cymosi, Tulipa maxima imo paulo majores, rubro-aurantiacei campanulati, limbo corollæ crispulo aureo-marginato.

Habit. non infreq. in sylvis primitivis Districtorum editorum juxta flumina, usque regionem littoralem ast raro descendendo.

In sylvis editis Distr. Libongo Sept. 1858 cum fructu leg. W.

N.º 7. Regio I.

Districto: Libongo.

R. (Congo littoralis.)

*Pterocarpus tinctorius* Welw. mspt.

Arbor spectabilis habitu *Ceratonixæ*, foliis pinnatis semper virentibus, floribus amene fragrantibus, paniculatis, aurantiaceis, legumine *monospermo* latissime alato!

Lignum pretiosum, rubro-sanguineum tinctorium.

In sylvis Distr. Libongo non freq.  
Sept. 1858 leg. W.

N.º 8. Regio III.

Districto: Pungo Andongo.

*Acacia pentaptera*. Welw. Herb. Angol.

*Acacia* sp. aff. *A. pentagonæ* Hook. fil.

Trepadeira de caule pentagono, 20—80 pés longo, folhagem das Mimosas, flores amarelladas em cabecinhas. (Flores ex albedo pallide flavescentes!)

Trepa nas arvores e sobre as rochas.  
Pungo Andongo 1857 leg. W.

N.º 9. Regio II circa 2:000 ped. elevata. (Robiniacæ  
Welw. Apont. phyt. Sectio Diocleæ.)

Districto: Golungo Alto.

*Dioclea reflexa* Hook. fil. in Flora Nigrit.

Frutex altissime scandens, foliis trifoliolatis, floribus racemoso-spicatis, speciosis, violaceo-purpureis.

Genus ob semina ab iis *Dioclearum diversa* forsan reformandum.

(Trepadeira mui formosa.)

Ad flumen *Muria* prope Trombeta in Golungo Alto.  
Sept. 1857 leg. W.

N.º 10.

*Bignonia Ferdinandi*. Welw. Herb. Angol.

Arbor magna, 30—40 pedalis, coma dilatata dense frondosa foliis imp. pinnatis, floribus maximis fasciculatis, ex aurantiaco-rubentibus speciosissimis. Mart. Apr. floret.

Capsulæ pendulæ, frequens 3 pedales!

Habit. rarius in sylvis primit. Distr. Golungo Alto.  
Semina init. Julii 1857 leg. W.

N.º 11. Regio III. 3:500 ped. altit. sup. Oceanum.  
(Convolvulacæ.)

Districto: Pungo Andongo.

*Calonyction muricatum* Don?

(? *Calonyction speciosum*  $\beta$  *muricatum*. Choisy in D. C. Prod.)

Herba late scandens, floribus magnis nunc albidis nunc amene purpureis, nocte imprimis fragrantibus, caule, petiolis et imo calycibus hinc inde muricatis.

In dumetis Præsidi Pungo Andongo *ravior*.  
Semina Maio 1857 leg. W.

N.º 12. Regio I et II. (Convolvulacæ.)

Districto: Golungo Alto, Cazengo et Benguella.

*Ipomæa Mendestii* Welw. Herb. Angol.

Frutex volubiliss altissime scandens, sylvarum primitiv. margines District. montos. eximie ornans.