

**7. PINANGA PHILIPPINENSIS** Becc. sp. n. — Frondis pinnatisectae segmentis numerosis creberrimis subtiliter coriaceis, utrinque in sicco concoloribus, alternis vel suboppositis rigidis rectis anguste lanceolatis, 15-30 mill. latis et 20-30 cent. longis, in parte mediana latiores quam alioquin, ad basin sensim constrictis, apice indivisis, longe acuminatis et breviter caudatis, argute 1-2-nerviis glabris, in sicco subtiliter striato-nervosis; rachi crassa luride (fugaciter?) furfuracea, supra acuto-carinata, subtus in parte basilaris rotundata, prope apicem planiuscula. Spadix diffusus (erectus vel patulus? — nunquam reflexus?) brevissime pedunculatus, ramis 22-26 cent. longis numerosis (15-18) paniculatis spiraliter insertis et undique sparsis patentibus filiformibus rectis subtetragonis vel compressiusculis glabris, florum scrobiculis superficialibus regulariter biseriatis. Flores . . . . . Fructus elliptici parvi, 10-12 mill. longi, 5 mill. lati, utrinque attenuati, apice breviter mamillati, perianthio fructifero cupulaeformi truncato 2 mill. alto, 3½ mill. lato, phyllis latissimis minute apiculatis, sepals basi callosis et quam petala paullo majoribus; semine ovato, areola embrionali profunda basilaris obliqua, rapheos ramis ad 5 late anastomosatis, albumine dense ruminato.

Abita. — Scoperta dal Sig. Vidal a circa 100 m. di altezza sul *M.<sup>te</sup> Bulacan* nelle Filippine (Vidal n.<sup>o</sup> 4064! e n.<sup>o</sup> 3950!).

Osservazioni. — Gli esemplari da me studiati sono molto incompleti e non consentono che di porzioni di fronde senza l'estremità e di uno spadice con frutti maturi. Ma anche da questi soli frammenti si riconosce una *Pinanga* assai robusta e con uno stipite di almeno di 3-4 cent. di diametro. È molto caratteristica per i segmenti molto fitti, dritti, rigidi, punto falciformi o sigmoidei, più larghi nel mezzo che altrove ed assottigliati alle due estremità. Anche gli spadici si distinguono da quelli della maggior parte delle *Pinanga*, per i rami che nascono a varie altezze sulla parte assile e diffusi in tutti i sensi, come nella *P. Manii* e nella *P. Ternatensis*. Lo spadice fruttifero che ho esaminato, ha la base dritta e non ripiegata, per cui ritengo che non si refletta dopo la fioritura. L'unica Specie di *Pinanga* a me nota delle Filippine è la *P. maculata* Porte, la quale essendo descritta sopra pianta giovane, non mi è dato di paragonarla con questa nuova Specie.

**8. NENGA MACROCARPA** Scortechini sp. n. mss. — Frondium petiolo 10-27 cent. longo, segmentis falcato-sigmoideis acuminato-caudatis, inferioribus angustis uninerviis, superioribus latioribus ac longioribus 2-nerviis, terminalibus nunc angustis acutis, nunc latis et in extremitate breviter et saepe obscure inciso-dentatis. Spadices fructiferi 30-40 cent. longi breviter pedicellati 3-4-partiti, ramis crassis hexastice dense floriferis. Flores masculi 10-12 mill. longi acute trigoni lanceolati flexuosi, sepalis angustis corolla vix longioribus, pistilli rudimento brevissimo tuberculiformi 2-3-lobo. Flores foeminei globosi in quartam ramorum superiorem partem parentes, staminodiis 6 brevibus praediti. Fructus elongati ellipsoidei 38-40 mill. longi, 15-18 mill. crassi, ad apicem attenuati, in vertice mamillati, stigmate profunde 3-partito, sive lamellis stigmatosis triangularibus convergentibus 2 mill. longis terminati; semine late ovato basi truncato apice abrupte breviterque subspinescenti-acuto, 15-16 mill. longo, 11-12 mill. lato, rafe lata longitudinaliter percurso ramisque ejusdem crebre reticulato.