

## ASTROCARYUM. Meyer.

**1. *Astrocaryum aculeatum.* Mart.** Stipite procero, solitario, aculeato. Frondibus curvo-patentibus; petiolo supra canaliculato, et dorso convexo, ubi regulariter et transverse lineis aculeorum obliquorum ornatur; foliolis oblique acuminatis, linearibus; drupa oblonga pistillo persistente, aculeata, rubro-aurantiaca.

*A. ACULEATUM* G. F. W. Meyer. *Esseq.* 266. *Mart. Pal.* 80  
*Kunth. En. III* 274 § 10.

**Hab.** *in montibus lacui José Açú proximis, in districto de Villa Bella, in Provincia Amazonum. Frutificat in februario.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 320)

Stipes ut altus 16<sup>m</sup>, diametro 0<sup>m</sup>,11; internodia 0<sup>m</sup>,2, aculeis referta; folia 25 contemporanea, 7<sup>m</sup> longa; petiolus 2<sup>m</sup>; rachis 5<sup>m</sup>; foliola 90<sup>m</sup>-100 utrinque, linearia oblique acuminata, 1<sup>m</sup>,06 longa, 0<sup>m</sup>,045 lata. Spadix ramosus 2<sup>m</sup>,5 longus; rachis 0<sup>m</sup>,40 longa.

**2. *A. acanthopodium.* —** Stipite nullo. Frondibus semicurvo-patentibus; petiolo ad basim late lanceolato et sursus cylindraceo, ad partem inferiorem aculeis irregulariter dispositis et ad superiorem parvulis fas-