

Dolo, 1913 (Bavicchi, n. 304. — Nom vern. : Tuemema); Kwango, juillet 1913 (H. Vanderyst, n. 1473).

***Scleria melanomphala Kunth.***

Bokala, 1913 (Nélis); Dolo, 1913 (Bavicchi, n. 63); Boko, 1913 (Vanderyst, n. 451); Sona-Bata, 1913 (H. Vanderyst, n. 539, 536); Kutu, 1913 (H. Vanderyst, n. 1824); Wombali, 1913 (H. Vanderyst, n. 1183).

***Scleria ovuligera Nees.***

Kitobola, 1913 (Flamigni, n. 514); Vallée de la Nyanga, 1909 (H. Vanderyst); Makundi (Kwilu), 1913 (H. Vanderyst, n. 3465bis).

***Scleria racemosa Poiret.***

Dundusana, 1913 (Mortehan, n. 368, 541 ; Sona-Bata, mai 1913 H. Vanderyst, n. 546); Wombali, mission de Casier Saint Jean, juin-août 1913 (H. Vanderyst, n. 740, 1883); Dima, juin 1913 (H. Vanderyst, n. 953).

PALMACEAE.

*RAPHIA Pal. Beauv.*

***Raphia Matombe De Wild. nov. spec.***

Spadix...; inflorescentiis lateralibus elongatis, plus minus arcuatis, 29-40 cm. longis, vagina vel spatha inferiore longe acuta, racemis inferioribus usque 12 cm. longis, superioribus, minoribus, basi spathellatis, spathella utroque latere plus minus longe acuta; floribus longitudinaliter utroque rachide uniseriatis, basilaribus femineis usque 21, superioribus masculis usque 20; floribus femineis spathella paullo superantibus, basi bibracteatis, bractea posteriore bicarinata, calyce brevissime trilobato circ. 6 mm. longo, lobis breviter cuneatis, demum unilateraliter et irregulariter fissis; corolla calyce circ. 1,5-2 mm. exserta, ovario glabro; floribus masculis 10-11 mm. longis, calyce circ. 4-4,5 mm. longo, trilobato, lobis triangularibus subacutis, petalis circ. 10 mm. longis et 2 mm. latis, acutis, staminibus 6, filamentis incrassatis, circ. 3,5 mm. longis, basi circ. 1,5 mm. connatis. Fructibus elliptico-obovoideis, basi obscure cuneatis, apice apicu-

latis, apiculo cuneato-acuto, circ. 5 mm. longo et basi 3 mm. lato, fructibus, cum apiculo, circ 5 cm. longis et 16 mm. latis, squamis 12-seriatis, longitudinaliter leviter sulcatis 6-7 mm. latis et 10-11 mm longis.

Région de Kisantu (J. Gillet. — Nom ind. : Matombe).

*Obs.* — Cette espèce, dont nous ne connaissons ni les feuilles, ni l'inflorescence complète, se caractériserait par ses petits fruits.

Nous publierons, ultérieurement, une étude plus détaillée sur cette espèce et sur les autres palmiers nouveaux dont nous donnons ici une diagnose.

**Raphia Morteihani** *De Wild.* nov. spec.

Foliis pennatis; foliolis superioribus oppositis 2-2,5 cm. distantibus, 20-40 cm. longis et 16-25 mm. latis, nervo mediano infra prominente, apice cuneato-acutis, margine et nervo mediano sparse spinosis, spinis 2,5 mm. circ. longis; spadix..., inflorescentiis lateralibus circ. 25 cm. longis, rigidis, spatha inferiore usque 9 cm. longa, compressa utroque latere carinata, carina apice bicornuta, cornis, circ. 15 mm. longis, rachide appressa; bracteis unilateraliter breviter acutis; spicis biseriatis, usque 5,5 cm. longis, superioribus circ 2 cm. longis, rachide primari apice usque 7 cm. nudo; floribus masculis utroque latera uniseriatis, calyce circ. 3 mm. longo, breviter trilobato, lobis circ 1 mm. longis; corolla 6-7 mm longa plus minus falciformi, lobis circ. 1 mm. latis, apice incrassatis et acutis; staminibus 6-7 filamentis liberis circ. 1 mm. longis, antheris sagittatis, apiculatis, circ. 2-2,5. mm. longis.

Dundusana, octobre 1913 (Morteihan, n. 613. — Plante des marais à fruits comestibles. — Nom ind. : Makeke).

*Obs.* — Espèce voisine du *R. Laurenti* De Wild.

**Raphia sankuruensis** *De Wild.* nov. spec.

Spadix usque 50 cm. longus et 10-12 cm. latus, densus, basi spathaceus, spathae oblique abscissae, unilateraliter acutae usque 9 cm. longae; inflorescentiis lateralibus 15-17 cm. longis, rigidis, vagina inferiore utroque valde carinata et plus minus longe cornuta, cornis plus minus divergentibus circ. 2 cm. longis, bracteis unilateraliter acutis; spicis utroque latera biseriatis, usque 7 cm. longis, superioribus brevioribus circ. 2 cm. longis, rachide primari apice plerumque