CATALOGO DAS SEMENTES A QUE SE REFERE A CARTA ANTECEDENTE

N.º 1. Regio I (littoralis) (Phænicaceæ) Welw. Apont. Districto: Barra do Dande et Libongo.
Hyphæne coriacea Gaertn.
Palma curiosissima, *trunco more Dracænæ Draconis* repetito dichotomo, coma sphærica, foliis flabelliformibus fibras textiles prestantissimas præbentibus. Fructus edulis.
Habit. freq. in littore Oceani ex Ambriz usque Loanda.
Fruct. matur. Sept. 1858 ad Dande. leg. W.

N.º 2. Regio II (Phænicaceæ)
Districto: Golungo Alto.
Raphia textilis Welw. mspt.
(Metroxilon textile W. olim).
Palma speciosa, foliorum pinnat. petiolis longis, foliolis elongatis, filamenta textilia præbentibus, baccis ovato-ellipticis vertice obtusis. A Raphia vinifera Flor. Nigrit. omnino *diversa* species.
Ad rivulos in Distr. Golungo Alto et Dembos.
Fruct. bene matur. 1857. leg. W.

N.º 3. Regio I et II. 0–2:000 ped. altit supra Oceanum. (Phænicaceæ.)
Districto: Icolo et Bengo.
Elaeis guineensis Lin.!
Variet. *macrosperma* Welw. mspt. Nigritis— *Dihóhó!*
Palma egregia, monoica, coma formosa non raro caudicem 30 pedalem coronante, fructu flavo-aurantiaco, oleo diviti, ubique culta, excepta III regione, ubi ob noctes frigidas vix prosperat. Vinum jucundum largitur, *Maluvo* dictum, omnesque totius stirpis partes Nigritis in vita domestica utilissimae.
Semina 1858 leg. W.

N.º 4. (Phænicaceæ.)
Districto: Icolo et Bengo.
Elaeis guineensis Lin.
Variet. microsperma Welw. Nigritis — *Disombo!*
Palma spectabilis, monoica, *oleifera* et *vinum* optimum præbens, *indigena* et freq. culta.
Semina 1858 leg. W.

N.º 5. Regio II et III. 1:800–3:500 ped. altit. supra Oceanum. (Meliaceæ.)
Districto: Pungo Andongo.
Melia æthiopica Welw. mspt.
Arbor pulchra, coma dilatata, foliis compositis ad *Melia* Azederach similibus maximis 2—3 1/2 pedalibus, floribus albis fragrantissimis, fructu *(drupa)* pruni domestici more monopyrena, pyrena cylindrico-elliptica. Stirps egregia cultura dignissima!
(Lignum fere Cedrelacearum!)
In sylvis Golungo Alto. 1857. leg. W.

N.º 6. Regio II.
Districto: Libongo inter Ambriz et Dande.
Spathodea campanulata. Pal. de Beauv. Flora Bennin. Bignonia tulipifera Schum. et Thon. Plant. guineenses etc.
Arbor mediocris, habitu Fraxini, et dum floret ex pulcherrimis totius Africæ tropicæ!
Folia pinnata, intense viridia; flores racemoso-cymosi, Tulipa maxima imo paulo majores, rubro-aurantiacei campanulati, limbo corollæ crispulo aureo-marginato.
Habit. non infreq. in sylvis primitivis Districtorum editiorum juxta flumina, usque regionem littoralem ast raro descendendo.
In sylvis editis Distr. Libongo Sept. 1858 cum fructu leg. W.

N.º 7. Regio I.
Districto: Libongo.
R. (Congo littoralis.)
Pterocarpus tinctorius Welw. mspt.
Arbor spectabilis habitu Ceratoniæ, foliis pinnatis semper virentibus, floribus amene fragrantibus, paniculatis, aurantiaceis, legumine *monospermo* latissime alato!
Lignum pretiosum, rubro-sanguineum tinctorium.
In sylvis Distr. Libongo non freq.
Sept. 1858 leg. W.

N.º 8. Regio III.
Districto: Pungo Andongo.
Acacia pentaptera. Welw. Herb. Angol.
Acacia sp. aff. A. pentagonæ Hook. fil.
Trepadeira de caule pentagono, 20–80 pés longo, folhagem das Mimosas, flores amarelladas em cabecinhas.
(Flores ex albido pallide flavescentes!)
Trepa nas arvores e sobre as rochas.
Pungo Andongo 1857 leg. W.

N. 9. Regio II circa 2:000 ped. elevata. (Robiniaceæ Welw. Apont. phyt. Sectio Diocleæ.)
Districto: Golungo Alto.
Dioclea reflexa Hook. fil. in Flora Nigrit.
Frutex altissime scandens, foliis trifoliolatis, floribus racemoso-spicatis, speciosis, violaceo-purpureis.
Genus ob semina ab iis *Dioclearum diversa* forsan reformandum.
(Trepadeira mui formosa.)
Ad flumen *Muria* prope Trombeta in Golungo Alto.
Sept. 1857 leg. W.

N.º 10.
Bignonia Ferdinandi. Welw. Herb. Angol.
Arbor magna, 30–40 pedalis, coma dilatata dense frondosa foliis imp. pinnatis, floribus maximis fasciculatis, ex aurantiaco-rubentibus speciosissimis. Mart. Apr. floret.
Capsulæ pendulæ, frequens 3 pedales!
Habit. rarius in sylvis primit. Distr. Golungo Alto.
Semina init. Julii 1857 leg. W.

N.º 11. Regio III. 3:500 ped. altit. sup. Oceanum. (Convolvulaceæ.)
Districto: Pungo Andongo.
Calonyction muricatum Don?
(? Calonyction speciosum β muricatum. Choisy in D. C. Prod.)
Herba late scandens, floribus magnis nunc albidis nunc amene purpureis, nocte imprimis fragrantibus, caule, petiolis et imo calycibus hinc inde muricatis.
In dumetis Præsidii Pungo Andongo *rarior.*
Semina Maio 1857 leg. W.

N.º 12. Regio I et II. (Convolvulaceæ.)
Districto: Golungo Alto, Cazengo et Benguella.
Ipomœa Mendesii Welw. Herb. Angol.
Frutex volubilis altissime scandens, sylvarum primitiv. margines District. montos. eximie ornans.