

18. *B. cyagroïdes*. *Barb. Rod. et Trail.* — Stipite altitudine 1,^m-1,5, diametro 0,^m15; vaginis petiolorum persistentibus obvelatis, cum pubescentia spinis deciduis: frondibus pinnatis; foliolis 30-33-jugis, 5-0^m,10 latis, linearibus, longe acuminatis; spatha breviter aculeata.

Hab. *ad fluvium Tapajós apud Uixituba*, ubi eam inveni anno 1872, simulque *ad fluvium Jamundá*. Ad hunc fluvium sunt specimina validiora. Invento est etiam apud Aveiros a Doctore Trail. Nulos vidi flores neque fructus.

(Barb. Rod. hb. Palm. 328)

19. *B. turbinocarpa*. — Stipiti mediocri, cæspitoso; frondibus concinnis; foliolis lanceolato-falcatis, longe acuminatis, subtus velutinis; spadice pubescentia ferruginea obsesso; fructibus turbinatis, tomento-pubescentia ferrugineo vestitis et aculeis parvis, nigris, erectis.

Hab. *in silvis aboriginibus ad superiorem fluvium Trombetas*. Fructus maturescunt februario.

(Barb. Rod. hb. Palm. 354)

20. *B. acanthocarpoïdes*. — Stipite cæspitoso, 2-3^m alto, aculeato; frondibus pinnatis; foliolis alternis obsoleti-falcatis, acuminatis; spadice poly-ramoso; drupa globoso-turbinata, lutea, aculeata.

Hab. *in primævis silvis ad fluvios Jatapú in Provincia Amazonica et Trombetas in Provincia Paraensi*. Floret septembri et fructificat februario. Indi vocant Juru-pary heua, vel flecha do diabo (*sagittam diaboli*.)

(Barb. Rod. hb. Palm. 349)

* *

(PINNATIFIDA AGGREGARIA)

21. *B. monticola*. — Stipite mediocri, erecto, inermi, solitario; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 5-4-jugis, lanceolatis; falcatis, longe acuminatis; spadice curvo, ramoso; spatha ad verticem aculeata; drupa globulosa, atro-rubra, parva.

Hab. *in superiore parte montis Taperinha in districtu Santarem in Provincia Paraensi. Fructus matu- rescunt junio.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 235)

22. *B. umbraticola*. — Stipite mediocri, aculeato: frondibus interrupte-pinnatis; petiolo et rachide aculeatis; foliolis bijugatis, falcatis, acuminatis; flore femineo, calyce inermi tridentato, corolla majore sub tridentata, aculeata'; ovario paulo aculeato.

Hab. *in iisdem locis, efficit cæspites 10-15, arundinaceas, quæ locos humidos prædiligunt. Floret septembri.*

23. *B. paucijuga*. — Stipite mediocri, erecto, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis bijugis, longe lanceolatis, longe acuminatis, ad eam partem dense ciliatis; spadice ramoso, curvo; spatha interiore aculeata tantum dorso (aculeis sub-fusceis basi ferme nigra).

Hab. *in campis ad Santarem in vicinia montis Pi- quiatuba, locis uidis.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 224)