

**Integritolia.** § acanthospatha.

**3. B. Trailliana.** — Palma acaulis. Frondibus integris cuneato-lanceolatis, bifurcatis, 1<sup>m</sup>,45 longis, 0<sup>m</sup>,36 latis; petiolo tomento ferrugineo obsito, lateraliter aculeato; aculeis bijugis. Drupa semi-turbinata, aculeis nigris, undulatis obsessa, rubra.

**Hab.** in lacum Caypurú et rivum (igarapé) Parauacu sub umbris silvarum. Fructus maturescunt februario.

(Barb. Rod. hb. Palm. 352)

**4. B. gracilis.** — Stipite humili, inermi, erecto; frondibus indivisis (foliolis connexis) furcato-bipartito 8-nervatis; petiolo basi invaginante, oblique truncato, aculeato; spadice simple; spatha tenuiter aculeata; drupa turbinata, coccinea. Habitu *B. simplicifrons* Mart.

**Hab.** in insula Apuhy contra cataractas ejusdem nominis fluvio Tapajós sub umbris silvarum. Fructus maturescunt augusto.

(Barb .Rod. hb. Palm. 226)

**5. B. armata.** — Stipiti mediocri; petiolo ad basim invaginante, aculeis subflavis ad extremitatem nigris vestito, supra vaginam paulo aculeato; frondibus indivisis, cuneatis, bifidis, ad margines sinuatis, cilia-

tis, ad paginam inferiorem velutinis. Flores et fructus nullos vidi.

**Hab.** *ad margines fluvii Jamundá.*

(Barb. Rod. hb, Palm. 362).

*Pinnatifolia § exacantha.*

**6. B. oligocarpa.** — *Barb. Rod. et Trail.* Deser. *Caudex* 3 pedalis, 2/5 pollicaris tenuis, sub-erectus, inermis, annulos conspicuis, haud vaginis ,aphyllis obvelatus, folia 11 aggregata secus apicem caudicis. *Folia* pinnata, bipedalia, pinnis 3-jugis; pinnae jugarum basalis et apicalis oppositae, pinnae mediæ duae (raro 3) alternae; pinnae basales venis primariis tribus, pinnae mediæ vena primaria unica, pinnae apicales venis sex. Pinnae lanceolatæ longe falcato-acuminatae, 10-11 pollicares, basales 1-1/2-2 pollicares latae, mediae 1-11/2, apicales 3-1/2, sparse pubescentes ad margines et venas subtus.

*Spadices* e vaginis foliorum viventum orti, simplices, pedunculis bipollicaribus. *Spatha* interior falcato lanceolato, lignea, inermis, compressa; *Spatha* exterior coriacea. *Baccæ* cujusquæ spadicis 5-8, oblongæ 1/2 × 1/3 polliacares. Quæ laeves nigræ. (Trail).

**Hab.** *in monte Curumu hanc speciem jam collegeram et dipinxeram. quam mihi deditissimus et clarissimus botanicus Dr. James Trail exemplar apud Aveiros, ad fluvium*