

24. *B. elegans*. — *Descr.* *Caudices* 2-3 ex eodem rhyzomate orti. *Caudex* 2-1/2-4 pedalis, diametro 1/3-1/2 pollicari, erectus, internodiis bipollicaribus; nodiis inermibus vel semiannulis spinarum 5-8; spinæ nigrae, verticaliter compressae, longitudine varia, 3/4 pollicari et minores. *Vaginis folii* non persistentibus vel solum secusapum, *Folia* interrupte-pinnata, 2-1/2 pedalia, petiolo 9-10 pollicari, (vagina 1-5 pollicari, opere rectiforme deciduis), petiolo squamulis rufis deciduis dense leproso, rache obscure lineato et pubescentia densa vagina multis spinis, petiolo ad basim paucis aculeis, aculei tenues and longitudine varia 1/2-1 pollicaris 2-6-natim aggregati. *Pinnæ* 20-22 jugae, inferiores 3-4-natim, superiores 6-8-natim aggregatae. 3-6 pollicares \times 3/5-3/6 pollicares, lanceolatae, supra medium latiores, Apice bifido, acute triangulari inaequaliter bidentulis; dente superiore longiore, 1/2-pollicari, dente inferiore subbifido; pinnæ apicalis tribus venis primariis, pinnæ inferiores vna primaria unica. *Spadix* bifida 11-1/2 pollicaris, pedunculo 8 pollicaris, decurso ramisfere equilongis 3-1/2 pollicaribus, petiolo superne, et basibus ramorum setis pilisque dense vilosis. *Spatha* interior 14 pollicaris elongato fusiformis, coriacea, dense aculeata aculeis tenuibus, nigris; spatha exterior coriacea. (*Trail.*)

Jam hanc speciem in monte Curumú depinxeram, nullo autem nomine designaveram, quam ipsam longo post tempore mihi amicissimus Dr. Trail ostendit et me, ut nomem darem, invitavit; nomem imposui, quo nunc utitur.

Hab. ad fluvium Tapajós apud Aveiros, in monte Curumú, ubi validiora sunt specimina.