

Integrifolia. § acanthospatha.

3. B. Trailliana. — Palma acaulis. Frondibus integris cuneato-lanceolatis, bifurcatis, 1^m,45 longis, 0^m,36 latis; petiolo tomento ferrugineo obsito, lateraliter aculeato; aculeis bijugis. Drupa semi-turbinata, aculeis nigris, undulatis obsessa, rubra.

Hab. in lacum Caypurú et rivum (igarapé) Parauacu sub umbris silvarum. Fructus maturescunt februario.

(Barb. Rod. hb. Palm. 352)

4. B. gracilis. — Stipite humili, inermi, erecto; frondibus indivisis (foliolis connexis) furcato-bipartito 8-nervatis; petiolo basi invaginante, oblique truncato, aculeato; spadice simplice; spatha tenuiter aculeata; drupa turbinata, coccinea. Habitu *B. simplicifrons* Mart.

Hab. in insula Apuhy contra cataractas ejusdem nominis fluvio Tapajós sub umbris silvarum. Fructus maturescunt augusto.

(Barb. Rod. hb. Palm. 226)

5. B. armata. — Stipiti mediocri; petiolo ad basim invaginante, aculeis subflavis ad extremitatem nigris vestito, supra vaginam paulo aculeato; frondibus indivisis, cuneatis, bifidis, ad margines sinuatis, cilia-