

**25.** *B. palustris*. — Stipite erecto, 4<sup>m</sup> alto, aculeato. Frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 2-7-jugis irregulariter, superne viridi-lucentibus, inferne albis; spadice pluriramoso; drupa globoso-turbinata, calyce et corolla minutissimis persistentibus.

**Hab.** frequentissime ad margines lacus Curumú in rivi (igarapés) fluvii Parauacú, in fluvio Trombetas. Floret decembri et fructificat martio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 330).

**26.** *B. rivularis*. — Stipite erecto, 7<sup>m</sup> alto, flexuoso, elato, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis; foliolos 4-6-jugis, abrupte recurvis; spadice pluriramoso; spatha aculeata; drupa globosa, vertice umbonato, atro-violacea.

**Hab.** ad margines lacus Curumú et fluvii Amazonum. Floret decembri et fructificat aprilis.

(Barb. Rod. hb. Palm. 194).

**27.** *B. littoralis*. — Stipite altitudine 9<sup>m</sup>, diametro 0<sup>m</sup>,08, erecto, aculeato; frondibus 6-7 contemporaneis, pinnatis; petiolo juniore tomento albo vestito, aculeato; foliolis semi-erectis, 4-5-jugis, linearibus nervura media ad partem superiorem saliente et ad verticem aculeata; spadice curvo, ramoso, aculeato; spatha aculeata. Baccam non vidi.

**Hab.** in ripas amnis Amazonum. Vulgo appellatur Marajá-açu da vargem.

**28.** *B. marajá-açu*. — Hæc species similis est *B. littoralis*, tantum differt spatha, quæ est diversa, valde

aculeata et fructibus, qui majores, quum maturescunt, et colore viridi neque rubro sunt.

**Hab.** *in interioribus silvis inundatis in districtu Santarem, ubi nota est nomine marajá-açu da terra firme.*

**29.** *B. granariuscarpa.* — Stipite cæspitoso, erecto, mediocri, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 3-4-aggregatis, sub opositis, lanceolatis, subfalcatis, oblique acuminatis. Flore femineo: calyce, corolla et ovario aculeatis, fructibus globoso-compressis, pseudo-muricatis.

**Hab.** *in depressis locis camporum de Santarem, fluvio Ipanema proximis. Floret maio.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 220)

**30.** *B. Constanciæ.* — Stipite mediocri, cæspitoso, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis. Fructus sunt globoso-depressi, diametro 0<sup>m</sup>,023, spinosi, viridi-rosei et postea violacei.

**Hab.** *in silva lacum Achipicá circundante ad fluvium Trombetas et ad rivum (igarapé) dos Remedios in fluvio. Rio Negro. Fructus maturescunt martio Aprili.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 342)

**31.** *B. interrupte-pinnata.* — Stipite inermi, brevissime annulata; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis linear-lanceolatis; drupa globosa, coccinea, aculeata.

**Hab.** *in silvis primævis ad lacum Curumú et cataractas fluvii Tarumá, in fluvio Negro. Fructus maturescunt maio. Indi muncupant Tayaçu-pupunha vel pupunha de porco.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 356)