

25. *B. palustris*. — Stipite erecto, 4^m alto, aculeato. Frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 2-7- jugis irregulariter, superne viridi-lucentibus, inferne albis; spadice pluriramoso; drupa globoso-turbinata, calyce et corolla minutissimis persistentibus.

Hab. *frequentissime ad margines lacus Curumú in rivis (igarapés) fluvii Parauacú, in fluvio Trombetas. Floret decembri et fructificat martio.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 330).

26. *B. rivularis*. — Stipite erecto, 7^m alto, flexuoso, elato, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis; foliolos 4-6- jugis, abrupte recurvis; spadice pluriramoso; spatha aculeata; drupa globosa, vertice umbonato, atro-violacea.

Hab. *ad margines lacus Curumú et fluvii Amazonum. Floret decembri et fructificat aprili.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 194).

27. *B. littoralis*. — Stipite altitudine 9^m, diametro 0^m,08, erecto, aculeato; frondibus 6-7 contemporaneis, pinnatis; petiolo juniore tomento albo vestito, aculeato; foliolis semi-erectis, 4-5- jugis, linearibus nervura media ad partem superiorem saliente et ad verticem aculeata; spadice curvo, ramoso, aculeato; spatha aculeata. Baccam non vidi.

Hab. *in ripas amnis Amazonum. Vulgo appellatur Marajá-açu da vargem.*

28. *B. marajá-açu*. — Hæc species similis est *B. littoralis*, tantum differt spatha, quæ est diversa, valde