

(5) Col nome di *C. flexuosa* si trova spesso nei giardini una forma dell'*Arecastrum Romanoffianum*.

(6) *Syagrus glaucescens* Becc. — *Cocos glaucescens* Glaziou Sched. in Herb. Becc. n. 20024.

Caudex.... Frondium rhachis furfuracea; segmenta per acervos 4-nos inter se conspicue dissitos densissime approximata, lineariorblanceolata, basi paullo angustata, ibique arcte inflexo-conduplicata, apice abrupte paullo inaequaliter angustata et fere obtusa sed acumine tenui rigido pungenti terminata, subtiliter coriacea, rigida, 30 cm. longa, 22-26 mm. lata, supra pallide virentia et indumento tenuissimo detergibili praedita, subtus glaucescenti-cerosa, costa media supra prominula, nervis secundariis utrinque 4-5, tenuibus; venulis transversis obsoletis. *Spadix* minor (circa 40 cm. longus) validus; spatha superiori fusiformi, acuminata, rigidissima, spisse coriacea, extus plicato-sulcata, peduculo compresso 7 mm. lato, saperne subclavato; ramis paucis rigidis, erectis, flexuosis, 10-12 cm. longis, basi crassis et flores foemineos 1-3 ferentibus, superne tenuioribus, acute angulosis et subscrobiculato-serratis, floribus masculis numerosis onustis, *Flores* ♂ coriacei, 11-12 mm. longi, inaqualiter lanceolati, acuminati, calyce brevi acute 3-dentato. *Flores* foeminei majusculi, conoidei, angulosi, masculis multoties majores, 15-20 mm. longi, sepalis coriaceis, triangularibus, acuminatis; petalis è basi latissima in acumen subulatum attenuatis. *Androcei* rudimentum breve, annulare, obsolete 3-denticulatum. *Fructus* globoso-ovati, utrinque rotundati, 25 mm. longi, 20 mm. crassi, monospermi; epicarpio furfuraceo; mesocarpio fibroso; endocarpio 4 mm. crasso, intus 3-vittato; semine globoso.

HABITAT. — Scoperto da Glaziou il 28 Marzo 1892 nel Brasile a Biribing presso Diamantina, Prov. di Minas-Geraës; n. 20024 nell'Erb. Beccari ed in quello di Copenhagen.

È una piccola specie, d'aspetto eminentemente xerofilo, affine a quanto sembra al *S. comosa*, caratterizzata dalle sue foglie glaucescenti molto rigide, con segmenti molto distintamente riuniti in gruppi assai discosti l'uno dall'altro, ma nei singoli gruppi ravvicinati fra di loro per le basi; essi poi sono coperti da un tenuissimo strato ceroso, che specialmente nella pagina superiore si stacca in sottili lamelle come in certe *Copernicia* e *Thrinax*; sono pure caratteristici gli spadici per la spata superiore strettamente fusiforme, molto coriacea e con pareti spesse 3 mm.; per i rami portanti pochi fiori feminei, grandi, conico-allungati, e per i frutti

globoso-ovati, forforacei allo esterno, con nocciolo striato e punteggiato-impresso all'esterno, a pareti spesse, con pori quasi superficiali e situati proprio alla base.

(7) *Syagrus Weddelliana* var. *cinerea* Becc. var. n. A forma typica differt frondium segmentis subtus indumento conspicue cinereo obtectis. — Brasile: Glazion N. 2758 in Herb. Beccari. — Sembra una forma intermedia fra il *Syagrus insignis* ed il *Syagrus Weddelliana*, delle dimensioni però di quest'ultimo o poco maggiori.

(Continua)

O. BECCARI