trum extenso ; rapheos ramis ab apice hili radiantibus. Foliorum segmenta apice longe acuminata. [Becc. emend. Pic. Ser.]. — Fig. 35.

Tra le due specie riferite originariamente a questo genere la scelta della specie tipo è facile poichè una di esse è stata separata da BECCARI come tipo di un genere distinto (vedi il genere seguente) e quindi la specie rimasta, *Cyphokentia Balansae* Ad. Brongn. deve essere il tipo del presente genere.

Come di consueto HOOKER f. non stabilisce le combinazioni di nomi delle specie sotto il nuovo genere, ma si limita a dire che a *Cyphosperma* appartengono *Cyphokentia Balansae* Ad. Brongn. e « *Cyphokentia Vieillardi* Ad. Brongn. » Ho fatto ricerche per stabilire l'autore e la citazione delle due specie trasferite nel genere *Cyphosperma*, ma senza buoni risultati. GUILLAUMIN [Ann. Mus. Colon. Marseille **19**, ser. 2 vol. 9 : 253. 1911] cita comunque queste due specie con i relativi basionimi, sebbene le attribuisca a BENTHAM & HOOKER f. Forse avanti di lui altri autori hanno stabilito le nuove combinazioni. Comunque queste due specie sono elencate nell'Index Kewensis come specie di *Cyphosperma* e rimandate ad esso da *Cyphokentia*. Naturalmente le due specie sono ivi attribuite a BENTHAM & HOOKER f.

Il genere *Cyphosperma* è endemico della Nuova Caledonia e monospecifico. [Pic. Ser.].

## 61. **Burretiokentia** Pic. Ser.

**Burretiokentia** Pic. Ser. nom. gen. nov.

Syn. : *Rhynchocarpa* Beccari, Webbia **5**(1) : 105. 1921, non *Rhynchocarpa* Schrad. Linnaea **12** : 403. 1838, *nomen* ; Schrad. ex Endl. Gen. Pl. 936. 1839 (Cucurbitaceae).

Flores ♂ symmetrici. Stamina 6, filamentis filiformibus longis apice valde inflexis ; antheris dorsifixis versatilibus ellipticis ; ovarii rudimento conspicuo, anguste conico, staminibus breviore. Fructus asymmetricus, siccus subpentagonus, conspicue granu-

---

Fig. 36 – **Burretiokentia** Pic. Ser. – *Burretiokentia Vieillardi* (Ad. Brongn. & Gris) Pic. Ser. : **a.** Fiore ♂ (× 7) – **b.** Fiore ♂ più giovane visto da un altro lato (× 7) – **c.** Fiore ♂ avanti l'antesi in sezione longitudinale mostrante un petalo, parte dell'androceo ed il pistollodio (× 7) – **d.** Petalo con stame al momento dell'antesi (× 7) – **e.** Antera (× 8) – **f.** Fiore ♀ (× 7) – **g.** Ovario in sezione longitudinale (× 7) – **h.** Frutto con perianzio fruttifero (× 4) – **i.** Frutto e seme in sezione longitudinale (× 4) – **k.** Frutto e seme in sezione trasversa (× 4) – **l.** Seme visto quasi di fianco (× 4) – **m.** Seme visto dal lato del rafe (× 4). [**a-g** : Nuova Caledonia : presso Conception, *Balansa 1962* ; **h-m** : Nuova Caledonia : Kanala, *Balansa 1962a*].


h
l
i
k
m
e
d
f
a
b
c
g

losus, oblique crasseque rostratus, stigmatum residuis apicalibus. Mesocarpium sclerosomatibus peripherialibus conspicuis, ellipsoideis instructum, coetero fibris fere carens. Endocarpium circumcirca aequali modo tenuiter lignosum. Semen remote ab apice loculi insertum, asymmetricum, irregulariter pentagonum, subcordatum; hilo anguste lineari a basi fere usque ad centrum extenso; rapheos ramis conspicuis ab apice hili radiantibus; embryone basilari. Foliorum segmenta apice acuminata. [Becc. emend. Pic. Ser.]. — Fig. 36.

Il genere *Rhynchocarpa* Becc. è illegittimo per l'esistenza dell'omonimo antecedentemente pubblicato *Rhynchocarpa* Schrad. che si riferisce ad un genere di Cucurbitaceae.* Il nome creato da BECCARI deve pertanto essere sostituito da un nuovo nome generico ed io propongo per esso il nome **Burretiokentia** dedicato a Max BURRET, infaticabile e profondo studioso della sistematica delle Palme alle quali dedica da molti anni la sua attività.

*Rhynchocarpa Vieillardi* (Ad. Brongn. & Gris) Becc. Webbia **5**(1) : 106. t. 7. 1921 unica specie appartenente al genere deve essere il tipo di *Rhynchocarpa*. Essa deve ora chiamarsi **Burretiokentia Vieillardi** (Ad. Brongn. & Gris) Pic. Ser. comb. nov. [= *Kentia Vieillardi* Ad. Brogn. & Gris, Ann. Sci. Nat. V. **2** : 162. 1864].

Il genere *Burretiokentia* è monospecifico** ed endemico della Nuova Caledonia. [Pic. Ser.].

## 62. **Goniocladus** Burret

**Goniocladus** Burret, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahl. **15**(1) : 86. 1940.

Spadicis ramorum axis sub florum glomerulis nonnihil producta. Florum glomeruli usque ad ramorum apicem fere 3-flori, ♀ intermedio, ♂ binis dextra sinistra superpositis, ad apices flores ♂ tantum 2 juxtappositi. Flores ♂ symmetrici, apice rotundati.

---

* Un altro omonimo, ma posteriore a quello di BECCARI, è *Rhynchocarpa* Backer ex K. Heyne, Nutt. Pl. Ned.-Ind. ed. 2. **2** : 739. 1927 (Leguminosae) che dovrebbe pur esso essere sostituito da un altro nome.

DE DALLA TORRE & HARMS, Gen. Siphon. 541. 1905, elencano un altro nome generico *Rhynchocarpa* (Compositae) attribuendolo a LESSING, Syn. Gen. Compos. 382. 1832, ma ciò è dovuto ad errore, poichè LESSING chiama il suo genere *Rhynchocarpus*. [Pic. Ser.].

** BURRET [Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahl. **11**(108) : 712. 1933] descrisse una nuova specie, che riferì con dubbio a questo genere (*Rhynchocarpa? pilosa* Burret), ma più tardi egli riconobbe che si trattava di una specie di un genere diverso : *Heterospathe pilosa* (Burret) Burret, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahl. **12**(113) : 328. 1935. [Pic. Ser.].