

liculatum attenuatis, vagina, petiolo rhachique dorso fascia albida notatis, pinnis remotis utrinque 5—6, elongato-lanceolatis, falcatis, longissime acuminatis, marginibus recurvis, apicibus paullo pendulis saepe semitortis, summis in lacinium latissimum confluentibus, supra opacis, subtus nitidis, nervo medio et duobus intramarginalibus validioribus, nervis secundariis utrinque 1—2; spadicibus femineis infra frondes erecto-patentibus, spathis jam inter florescentiam exaridis, simpliciter ramosis, ramis 6—8 erectis, floribus depressis, ovalibus, ovariis subglobosis, viridulis, rudimentis staminum nullis; ramis spadicis, calycibus petalisque flavescentibus.

Plantam masculam non vidi.

Patria: N. Granada.

Caudex diametro 5—6 lin., annulis 3—4 poll. distantibus. Frondes 3—3 $\frac{1}{2}$ ped. longae, vagina 9—11 poll., petiolo 5—6 poll., rhachi 14—15 poll., pinnis 10—11 poll. longis, 2 $\frac{1}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$ poll. latis.

Indidi huic speciei nomen F. Bartling, Phil. Dr., universitatis Gottingensis decoris et ornamenti, acerrimi ingenii botanici, praeceptoris mei carissimi.

18. *Ch. brevifrons* sp. n. Caudice erecto, remote annulato; frondibus patentibus, pinnatis, viridibus, vaginis cylindricis apice longe apertis, auriculatis, petiolis brevibus obtuse trigonis, basi supra callosis, rhachi supra acutangula, vagina, petiolo rhachique dorso fascia albida notatis, pinnis utrinque 6—8 subaequidistantibus, alternis, oblongo-lanceolatis, falcatis, basi contractis, acuminatis vel abrupte acuminatis, apicibus pendulis, summis confluentibus, nitidis, nervo medio et duobus intramarginalibus validioribus, nervis secundariis utrinque 3; spadicibus masculis infra frondes erecto-patentibus, spathis apicem versus inter florescentiam exaridis,

simpliciter ramosis, ramis longis 9—12, pendulis, floribus subrotundis, petalis, latere minime distantibus, flavovirentibus.

Plantam femineam non vidi. • •

Patria: N. Granada.

Caudex diametro 5—6 lin., annulis 3—4 poll. distantibus. Frondes $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ ped. longae, vagina 6—7 poll., petiolo 3 poll., rhachi 12 poll., pinnis 7—9 poll. longis, 2— $2\frac{1}{2}$ poll. latis. Spadices masculi 15 poll. longae, ramis 9 poll. longis.

Proxime affinis Ch. Lindenianae mihi, sed pinnis minoribus et floribus minus apertis sat differt.

19. Ch. gracilis Willd. in Act. Berol. 1804 p. 41. Ejusd. spec. plant. IV. 2 p. 800. Mart. Hist. II. p. 3, III. p. 160. Kunth Enum. III. p. 172 no. 6. Klotzsch in Linnaea 1847 p. 446. Borassus pinnatifrons Jcq. Hort. Schoenbr. II. 65 t. 247, 248.
20. Ch. lepidota Hrn. Wendl. in Otto et Dietr. Gartenz. 1853 no. 18 p. 138.
21. Ch. Schiedeana Mart. in Linnaea 1830 p. 204. Link in Otto et Dietr. Gartenz. 1834 no. 20 p. 153, t. 6 B. Mart. in Otto et Dietr. Gartenz. 1834 no. 31 p. 245. Ejusd. Hist. III. p. 158, t. 138, t. R. fig. II. IV. V., t. V. fig. I., t. Z. fig. III. 1—9, t. Z. II. fig. XIII., t. Z. V. fig. VI., t. Z. IX. fig. II. 1—41, t. Z. XVII. fig. VIII., t. Z. XXIII. fig. I. II. Kunthia xalappensis in Otto et Dietr. Gartenz. 1833 no. 1 p. 1.
22. ? Ch. graminifolia sp. n. Caudice remote annulato; frondibus erectis, pinnatis, vaginis cylindricis, apice paululo apertis et subauriculatis, petiolis subrotundis, basi supra callosis, evanescente canaliculatis, rhachi supra acutangula, vagina, petiolo rhachique dorso fascia dilute viridi obsolete