

Unter der gleichen Nummer liegen auch männliche Kolben vor:

*Pedunculus tenuis*. Rami circ. 10, circ. 10 cm longi. Flores ♂ in spira densiuscula dispositi, late insidentes, inmersi, subglobosi, unter minores. Perianthium dense costatum. Calyx brevis, obscure 3-lobulatus. Petala apice coadunata, lateraliter tantum libera. Antherae oblongae, loculis connatis. Pistillodium columnare.

48. *Chamaedorea micrantha* Burret nov. spec. — Caudex ad 1 cm in diam., internodiis circ. 10—12 cm longis. Vagina 1,5 cm circ. in diam. Petiolus longus, tenuis. Lamina inter minores, 50 cm circ. longa, late oblonga, tenuis, segmentis utrinsecus 5—6. Rhachis tenuis, usque 38 cm longa. Segmenta inter minora, apicalia quam sequentia duplo latiora, sequentia lanceolato-sigmoidea, majora 18 cm circ. longa, 3,5—5 cm in diam., sed etiam minora, praecipue basilaria. Pedunculus circ. 35 cm longus. Spathae 6 mm circ. in diam., suprema pedunculum superans. Rami numerosi, longi. Flores ♂ densiusculi, parvi, cylindrici, 2 mm altitudine vix aequantes. Perianthium dense costatum. Calyx 3-lobus, usque 1 mm altus, lobis rotundatis. Petala apice coadunata, lateribus solutis. Stamina 6, filamentum tenui, antheris lineari-oblongis, thecis connatis. Pistillodium cylindricum.

Guatemala: Ohne genauere Angabe (H. von Tuerckheim A8).

Die Art ist *Ch. concolor* Mart. nahe verwandt, jedoch sind Wedel und Fiedern viel zierlicher.

49. *Chamaedorea concolor* Mart. Hist. nat. Palm. III (1833/50) 160; — *Nunnezharaea concolor* (Mart.) O. Ktze. Rev. Gen. II (1891) 730; — Prob. hinc pertinet: *Ch. Lindeniana* H. Wendl. in Otto und Dietr. Allg. Gartenzeit. XXI (1853) 139, Oerst. in Vidensk. Medd. Naturh. For. Kjöbenhavn 1858 (1859) 21.

Mexico: Zwischen Misantla und Cuesta Grande de Chiconquiaco (Schiede n. 1018). Veracruz, Zacuapan, Baranca de Icuampa, feuchter Wald (Purpus n. 2110). — Wahrscheinlich gehört hierher auch: Isthmus von Tehuantepec, Pflanzung Ubero, Urwald, 100 m. Zwergpalme, bis 2 m hoch (P. Preuß n. 1414).

Obwohl das vorhandene Material schwer vergleichbar ist, habe ich doch kaum einen Zweifel, daß *Ch. Lindeniana* H. Wendl. mit *Ch. concolor* Mart. völlig identisch ist.

50. *Chamaedorea Holmgrenii* Burret n. sp. — Caudex in regione spadiciis 1 cm fere in diam., glaber, annulis 3,5—4 cm dissitis. Frondes membranaceae, utrinque i. s. atrovirides, praecipue subtus nitentes, pinnatisectae. Vagina cylindrica, longitudinaliter striata, glabra. Petiolus 26 cm circ. longus, dorso ut rhachis fascia albida notatus. Rhachis supra acuta, 28 cm longa. Foliola in quoque latere 5, sig-