

apicem ♂ solitariis. Flores ♂ sat humiles, acutiusculi, vix vel paululo altiores quam lati. Sepala tenuia, oblonga vel oblongo-lanceolata. Petala late vel latissime ovata, acutiuscula, extus tenuiter longitudinem secus nervoso-striata. Filamenta brevia. Antherae ovaes. Pistillodium tuberculiforme.

Colombia: Depart. Antioquia, Amalfi: La Vivora, Wald. Bachränder, etwa 1650—1750 m. Mehrere Stämme, dicht mit 5—20 cm langen Stacheln besetzt, 3—6 m hoch (10. Mai 1880 — W. KALBREYER n. 1653).

Eine sehr ausgezeichnete Art.

24. *Aiphanes hirsuta* Burret nov. spec. — Palma caespitosa, caudicibus pluribus, 4—8 m fere altis, crassitie fere brachii humani, aculeis nigris dense armatis. „Frondes 1,2—1,5 m circ. longae, segmentis utrinsecus 21—22.“ Petiolus 40 cm longus visus, ut videtur, haud furfuraceus, setis parvis, nigris, numerosis et aculeis nigris, minoribus et majoribus, usque 9 cm longis. Rhachis [setis flavidis, fuscis vel nigris crebris vel subdensis inferne aculeata. Segmenta valde irregulariter disposita, ex rhacheos fragmentis visis 3—5 dense aggregata, spatiis longis et longissimis interjectis, sat tenuia, longitudinaliter subplicata, conspicue, sat late cuneata, pilis longis, flavidis, crebris utrinque, supra saepe plus minus decidue hirsuta, subtus supra basin in costa media saepe aculeata, apice lobato- vel lobulato-praemorsa, saepe in marginibus ambobus, dextra sinistra, magis tamen plerumque in latere superiore modice producta, maxima visa 35 cm longa, ad 7 cm lata, plura circ. 26 cm longa, 6,5 cm circ. lata et minora, basilare visum circ. 6 cm longum, 4,5 cm latum. Spatha superior fere 60 cm longa visa (inferne incompleta), superne ad 4 cm lata, tenuiter lignosa, extus setis parvis, fere nigris, densis et aculeis fere nigris, magnitudinis mediocris, inferior coriacea, superne glabra, nitens, 2 cm lata. Pedunculus setis parvis, atrobrunneis et aculeis tenuibus densis obsitus. Pars ramosa 40 cm longa, ramis 13. Rami longissimi infimi 32 cm longi, omnes inferne setis longis, per totam longitudinem brevioribus atrobrunneis dense obtecti, ad magnam partem, dimidiam et ultra glomerulis florem ♀ et masculos superpositos gerentibus in spira laxa praediti, superne floribus masculis. Flores ♂ paulo altiores quam lati. Sepala tenuia, ovata-oblonga vel oblonga, acuta. Petala ovata. Antherae ovaes. Flores ♀ profunde immersi.

Colombia: Depart. Antioquia, Amalfi: La Vivorra, Wald, 1500 bis 1700 m. Mehrere Stämme, 4—8 m hoch, fast armdick, dicht mit schwarzen Stacheln besetzt (11. Mai 1880 — W. KALBREYER n. 1657).