

*brevia*. Antherae suborbiculatae. Pistillodium corpusculum minutum, 3-gibbosum. Flores ♀: Sepala late rotundata. Petala inferne connata, lobis 3-angularibus, valvatis. Cupula staminodialis margine sat obscure dentata, dentibus non anguste productis.

Colombia: Depart. Antioquia, Rio Verde, Wald, etwa 1500 bis 1700 m. Mehrere Stämme, etwa 2—3 m hoch, stark fingerdick (blühend 28. Juli 1880 — W. KALBREYER n. 1864). Typus. — Depart. Antioquia, Concordia. Im Waldesschatten, 1950—2100 m. Mehrere Stämme, 2—2,5 m hoch, fingerdick (blühend 29. März 1880 — W. KALBREYER n. 1513). — Depart. Valle, Urwald Alto Mercedes, 2000 m, 2—3 m hohe Palme mit schwarzen Beerenfrüchten (E. DRYANDER n. 1288).

Das Exemplar von Frau DRYANDER stimmt sehr gut mit den Pflanzen von KALBREYER überein. Die Rhachis des größten Wedels mißt 47 cm. Das Stämmchen hat knapp 1 cm Durchmesser, die Internodien sind etwa 6 cm lang, der vollständige Pedunkulus eines Blütenkolbens 50 cm.

16. *Aiphanes Ulei* (Dammer) Burret nov. comb. — *Martinezia Ulei* Dammer in Verh. Bot. Verein Prov. Brandenburg XLVIII. 1906 (1907) 127.

Peru: Depart. Loreto, Cerro de Escalero, 1200—1300 m, Zwergpalme 2—4 m (E. ULE n. 6880).

17. *Aiphanes deltoidea* Burret nov. spec. — Palma caespitosa, caudicibus pluribus, majoribus et minoribus contemporaneis, ex eodem rhizomate orientibus. Caudices 1,5—2 m longi, aculeati, frondes 10—12 gerentes. Petiolus 35 cm longus visus, validus, dense fusco-leprosus, aculeis validis, 3 cm paulo superantibus, nigris, sed margine ad maximam partem fusco-fibrosis, setis nullis. Frons 1,40 m circ. longa, ambitu oblonga, segmentis utrinsecus circ. 12, valde irregulariter dispositis, 2—3 aggregatis, spatiis longissimis interjectis. Rhachis inermis, aculeis, setis et pilis omnino carens, subtus dense fusco-leprosa. Segmenta inter majora, tenuia, i. s. utrinque subconcoloria, dimidia inferiori rhacheos inserta subtus in costa media supra basin fere regulariter aculeo unico nigro, circ. 4—5,5 cm longo armata, omnia supra inermia et glabra, subtus praeter aculeum descriptum inermia et subglabra, late, elongato-deltoideo-cuneata, apicalia rhacheos 2—2,5 cm tantum amplectentia, in margine interiore 26 cm longa, 8—11 cm in maximum diam., apice oblique lobulato-praemorsa, cetera in margine superiore tantum anguste caudato-producta, majora visa in costa media circ. 28 cm, in acumine lateraliter producto ad 6 cm etiam longa, segmenta inferiora breviora, sed saepe pro rata latiora. Spadices interfronales,