

551. *Mooreanum* Wendl. & Drude.  
„Moore's S.“  
*Lepidorhachis* Wendl. —

*Kentia* F. Müll.  
Lord Howe-Insel (bis 2500'  
Höhe).

### 75. *Cyphokentia*

Brgt. Compt. Rend. Acad. Scient. Paris. 1873, 27, 399 ex parte.  
*Höckerkentia*.

Benth. & Hook. Gen. pl. III., II. 894, 25.

Stamm aufrecht, stark, unbewehrt. Blätter endständig, gefiedert; Segmente fast schwertförmig, lederig. Kolben kräftig, glatt, starkverzweigt. Blüten monoecisch. Frucht klein, kugelig oder elliptisch, einsamig mit klumpigem Perikarp.

Samen elliptisch oder rund. Scheiden 2, abfallend.

552. *macrostachya* Brgt., Frucht  
fast rund. „Großährige H.“  
*Kentia* Brgt. & Gris.  
Neukaledonien.

553. *robusta* Brgt., Frucht fast nie-  
renförmig-elliptisch. „Starke H.“  
*Kentia* Brgt. & Gris.  
Neukaledonien.

### 76. *Cyphosperma* H. Wendl. in litt. Höckersame.

Brgt. Compt. Rend. Acad. Sc. Paris. I. 27. 5. — Benth. & Hook. Gen.  
pl. III., II. 895, 26.

Stamm unbewehrt, geringelt. Blätter endständig, gefiedert; Segmente lederig, langschwertförmig, am Ende schräg abgebissen-gezähnt. Kolben leichtbehaart oder kahl, fast doppelreihig ver-  
zweigt. Blüten monoecisch, braun.

Frucht klein, kugelig oder fast würfeligoval, braun, mit dünn-  
brüchigem Perikarp.

Samen höckerig oder fast spitzkantig.

554. *Balansae* Wendl., Frucht  
kugelig. „Balansa's H.“  
*Kentia* Brgt. & Gris. — *Cypho-*  
*kentia* Brgt.  
Neukaledonien.

555. *Vieillardii* Wendl., Frucht  
stumpf 4-5 kantig. Vieillard's  
H.“  
*Kentia* (*Cyphokentia*) Brgt.  
Neukaledonien.

### 77. *Microkentia* Wendl. Benth. & Hook. Gen. pl. III., II. 895, 27. Kleinkentia.

Stamm unbewehrt, rohrartig, schlank, geringelt. Blätter end-  
ständig, fiederschnittig, Segmente lang-schwertförmig zugespitzt,