

sind sehr unregelmäßig. Recht auffallend sind die einander dicht folgenden, nur sehr wenig von der Achse entfernten — das Involucrophorum ist nur sehr kurz und dick — in zwei einseitig genäherten Reihen angeordneten Früchte.

**Daemonorops megalocarpus** Burret nov. spec. — Scandens. Frons elongata, cirrhifera, segmentis numerosis, regulariter dispositis. Vagina tenuiter atro-fusco- fere nigro-furfuracea, aculeis irregularibus haud annulatim transverse seriatis, atris, valde applanatis, usque 4 mm latis, usque 4 cm et ultra longis, plurimis nonnihil minoribus, sed omnibus applanatis. Segmenta visa usque 40 cm longa, 1,7 cm lata, linearis-lanceolata, recta, nullo modo curvata, anguste acuminata, subtus i. s. pallidiora, supra ad costam medium tantum spinulosa, subtus ad nervos validiores setis longis praedita. Spadix 30 cm fere longa. Pedunculus 12 cm longus, aculeis numerosis usque 3 cm fere longis, sat applanatis atque aculeis brevibus atris. Spadicis pars ramosa parva, angusta, ramis primariis circ. 5—6, parvis, pauciramosis. Rami primarii bracteis longe productis acuminatis suffulti. Rami breves, fructus paucos gerentes. Fructus maximi, subglobosi, paulo longiores quam lati, utrinque late rotundati, stigmatum cono angusto, brevi subito imposito, cum eo et perianthio 3,2—3,5 cm longi, 2,5—2,9 cm diam. Perianthium fructiferum breviter cupuliforme, supra lobis explanatis, corollae lobis quam calycis nonnihil longioribus, lanceolatis. Squamae in orthostichis 15 dispositae, atro-stramineae, nitentes, sulco angusto, profundo, margine angusto atro, apice haud producto. Semen irregulariter subglobosum, i. s. 1,8—2 cm diam., ruminationibus densis. Chalaza superficialis.

Süd-Sumatra: Östlich Benkulen bei Kepahiang, oberhalb Kaba Wetan, kletternd, mit regelmäßigen Fiedern (11. Mai 1939 — M. Burret).

Die Art gehört in die Verwandtschaft von *D. ochrolepis* Becc. und *D. Clemensianus* Becc. Sie ist ausgezeichnet durch sehr große Früchte, die etwas länger als breit sind. Am besten schließt sie sich an *D. Clemensianus* an, ist jedoch durch die sehr großen, flachen, breiten Stacheln der Blattscheide verschieden. Auch sind die Früchte im Gegensatz zu denen von *D. Clemensianus* länger als breit.

**Daemonorops plagioeyclus** Burret n. sp. — Scandens. Frondes cirrhiferae. Frondis vagina 2,5 cm diam. vix aequans, praeter spinarum annulos laevis, inferne ± decidue leviter furfuracea, ad marginem superiorem ipsam oblique truncatam spinis applanatis minoribus densis praedita, infra marginem cristis brevioribus oblique vaginam partim cingentibus spinulas gerentibus circ. 5, dein collaribus circ.