

tudinaliter sulcatis, basi stramineis, margine fusco-rubescenti cinctis, orthostichis 15; seminibus 3, albumine aequabili. *C. manillensi* valde proximus, differt fructibus ovoideis et squamis numerosioribus. Verisimiliter e congerie *C. palustris*, frondibus radicalibus pari-pinnatis, superioribus cirriferis.

Luzon Isl., Prov. Rizal, Antipolo (MERRILL no. 1645).

Daemonorops Blüme

1. *Daemonorops Gaudichaudii* Mart.

Luzon Isl., Prov. Bataan, Dinaluphihan (MERRILL no. 1669; February 1903); Prov. Rizal, Antipolo (MERRILL no. 1644; February 1903).

2. *Daemonorops ochrolepis* Becc. n. sp. Caudicis vaginae circ. 5 cm diam., spiculis spadiceis numerosissimis seriatis armatae. Frondium petiolus brevis subbiconvexus marginibus acutis spinis brevibus armatis; segmenta numerosa aequidistantia elongato-lanceolata vel ensiformia-lanceolata, acuminata 39—40 cm longa, 3—3,5 cm lata, costa medio supra nuda, subtus remote setosa, marginibus appresse spinulosis. Spadix strictus, fructifer 75 cm longus, spatha extima coriacea oblongo-spathulata, basi (in parte pedicellari) et in carinis 2 dorsalibus spiculis spadiceis obsita; fructibus sphaericis in vertice conico-mammillatis, 17—18 mm diam., squamis pallide stramineis fere albescentibus margine vix fusciscenti, convexis nitentibus anguste longitudinaliter sulcatis; orthostichis 15; semine globoso. Cum *Daem. Gaudichaudii* (Sect. *Piptospathae*) consociandus sed vaginae et spathae crinitis nec non fructibus albescentibus facile distinguendus.

Luzon, Prov. Tayabas, Guinayangan (MERRILL no. 2069).

3. *Daemonorops virescens* Becc. n. sp. Caudicis vaginae spinis rectis validis seriatis vel solitariis armatae. Frondium petiolus elongatus supra planus, subtus convexus, utrinque spinosus; segmenta numerosa inaequidistantia in quovis latere saepe geminata vel terna ensiformia 45—50 cm longa, 2,5—3 cm lata, supra prope apicem in nervis tribus, subtus in costa media tantum remote spinuloso-setosa. Spadix nutans paniculatus, pedunculo elongato acute ancipiti inermi; fructibus ovoideo-ellipticis abrupte breviterque conico-mucronulatis 25 mm longis, 16—17 mm latis, squamis nitentibus pallide virentibus apice fusco-maculatis anguste longitudinaliter sulcatis; orthostichis 18; semine ovoideo-