

tantum dilatatis. Frons collecta 1,75 m longa, haud cirrhifera. Rhachis subitus aculeis recurvatis simplicibus, utrinsecus segmentis 10 tantum longe dissitis sed regulariter dispositis. Segmenta apicalia ambo basi breviter 3 cm connata, lanceolata, 29 cm longa, 3,5—4,3 cm diam., superne attenuata, acuta, haud acuminata, segmenta basilaria quam reliqua paulo minora, reliqua lanceolata, dimidia parte latissima, utrinsecus attenuata, basi angusta, apice acuta, haud acuminata, majora 50 cm longa, 5,3 cm lata, nervis validioribus 5—6, nervis transversalibus supra optime conspicuis, dense sequentibus, undulatis, margine ad apicem tantum spinulosa, utrinque laevia. Spadix ♂ cirrifer, rhachis aculeis recurvatis simplicibus vel 2—3 unguiformiter conjunctis, longitudine, ut videtur, fere frondis, ramis tenuibus, graciliter pendulis. Spathae primariae longe anguste vaginantes, numquam fissae, apice trianguli. Inforentiae partiales numerosae, graciliter 4-plo ramificatae. Spathellae anguste vaginantes, triangulariter productae, rami ramulique ad spathellarum os inserti, tenues. Ramuli alabastra gerentes tenues, 2 cm longitudine paulo superantes. Spathellae floriferae vix infundibuliformes, excavato-triangulares. Involucrum fere explanatum. Alabastra parva, ambitu oblonga, calyce 3-löbato, i. s. costato.

Sumatra: Lebong Tandai nördlich Benkulen (16. Mai 1939 — M. Burret).

Da ich nur eine männliche Pflanze angetroffen habe, ist die Verwandtschaft nicht ganz sicher. Ich möchte die Art in Beccaris Gruppe V unterbringen, vielleicht in der Verwandtschaft von n. 35 *C. filipendulus* Becc. tab. 45. Nach dem Schlüssel paßt die neue Art insofern nicht hierhin, als ihre Endfiedern nur ganz kurz verbunden sind. Im übrigen sind ihre Fiedern ähnlich denen der genannten Art, nur zahlreicher. Auch ist ihr Kolben, obwohl er vielmals größer und vielfach verzweigt ist, in seinen Ästen ebenfalls sehr dünn und zierlich. Ähnlich und wohl näher verwandt ist *C. rhytidomus* Becc. Suppl. tab. 3, ebenfalls in Gruppe V. Es sind jedoch bei *C. latisectus* Spathae, Spathellae und Involucra nicht rauh und die Bestachelung der Blattscheide ist sehr verschieden. Erwähnen möchte ich noch *C. benkulensis* Becc. in Gruppe X. Die Fiedern sind ähnlich, im übrigen ist die Art in mehrfacher Hinsicht völlig verschieden. Das gleiche gilt übrigens auch für *C. Hewittianus* Becc.

Daemonorops Uschdraweitianus Burret nov. spec. — Humilis. Frondes elongatae, cirrhiferae. Vagina aculeis usque 6 cm fere longis, applanatis, usque 4 mm fere latis, et minoribus horride armatus, forsitan partem vaginae secus tantum transverse seriatis et conjunctis,

vaginae fragmento tantum viso. Rhacheos fragmentum: circ. 1 m longum, sine summo apice et basi, utrinsecus segmenta 21—23 gerens, greges 5—6 formantia. Segmenta in grege regulariter sequentia, sed subito spatiis plerumque 12—16 cm longis, rarius brevioribus interrupta, anguste linearis-lanceolata, potius linearis, nullo modo curvata, maxima 40 cm fere longa, usque 2,6 cm lata, supra in costa media, subtus nervis validioribus omnibus, interdum ulterioribus setosis. Spadix sat elongatus, regulariter, ramis haud nimis dissitis squarroso-ramosus. Pedunculus incompletus 30 cm longus, aculeis numerosis 2—3 transverse seriatis, circ. 1,2—2,2 cm longis applanatis, divergentibus albidis et minoribus armatus. Spathae inferiores coriaceae, lineares, planae, aculeis transverse breviter ad 3—4 plerumque seriatis, basi connatis, circ. 5 mm et paulo ultra longis. Rami superiores bracteis triangularibus, haud infundibuliformibus suffulti. Spadicis rhachis utrinsecus ramis primariis 10, praeter supremos 4 omnes iterum ample patenter squarroso-ramosus. Rami infimi utrinsecus ramulis fructiferis 4 distichis, quorum maximis usque 6 cm longis, distichis, fructus 4 utrinsecus gerentibus. Involucrophorum conicum. Fructus abundanter resiniferi, resina sanquinei, ovales, i. s. cum perianthio, sine stigmatibus 1,5 cm longi, utrinque rotundati, cono stigmatifero fere nullo, stigmatibus curvatis, 1,5 mm longis. Calyx humillimus, fere explanatus, subtriangularis, 5 mm circ. diam., margine hinc inde fisso. Corolla quam calyx nonnihil major, lobis longis, lanceolatis. Squamae in orthostichis 14 dispositae, parte libera 2,5 mm longa, 3,5 mm diam. Semina nondum plane matura.

Sumatra: Wald bei Medan (9. Juni 1939 — Uschdraweit et Burret).

Diese Art widme ich Herrn Uschdraweit, mit dem ich sie gemeinsam sammelte und der mir vieles Interessante in der Umgebung von Medan zeigte.

Sie lässt sich am besten mit n. 44 in Beccaris Monographie, *D. gracilipes* Becc. vergleichen. Ausgezeichnet ist sie durch die sehr stark harzhaltigen, in trockenem Zustand mit einer Kruste von rotem Harz bedeckten, relativ kleinen, ovalen Früchte, die langgestreckten, in nicht zu großen Zwischenräumen sparrig und reich verzweigten weiblichen Kolben, die nur zu wenigen in Querreihen verbundenen flachen, breiten, großen Stacheln der Blattscheide und die wenigen ebenso quer verbundenen, an der Basis verwachsenen kleinen Stacheln der Spathae sowie die durch große Zwischenräume unterbrochenen Fiedern. Die Art trafen wir in nicht kletterndem Zustand an.