

10. — **DYPsis VIRIDIS** nov. sp.

Gracillima, caudice 5-7 mm. diam., internodiis 1 cm. 5-2 em. diam. Folia viridia diluta, petiolata (5-6 cm.), segmentis fere aequalibus, vel interdum 8-10, quorum nonnulla angustiora, lateralibus ovatis, leviter sigmoideis, acuminatis, 2 cm. 5-3 cm. 5 latis, longe decurrentibus, terminalibus aliquid latioribus, in flabellum 14-15 cm. longum, 8 cm. latum, alte (8 cm.) furcatum, basi confluentibus. Spadix folia æquans, pendens, simpliciter vel duplo ramosus, squamulis laciniatis plus minus rapide caducis indutus. Florum glomeruli bractea communis triangularis, laciniato-barbata. Flos masculus 3 staminibus, lato filamento, connectivo crasso, loculis lateralibus.

Forêt orientale, à 400 mètres d'altitude, dans les environs de la baie d'Antongil (P. B., oct. 1912, 12057).

Forêt de Fananehana, environs de la baie d'Antongil (P. B., 12031.) Espèce à rejets.

11. — **DYPsis LINEARIS** nov. sp.

Gracilis, usque ad 2 m. alta, caudice usque ad 3 cm. diam. Folia longe (9-13 cm.) petiolata; 6-9 segmentis, lateralibus non decurrentibus, 15-23 cm. longis, 1 cm. latis, terminalibus fere similibus, basi vix (1 cm.) decurrentibus. Spadix simpliciter ramosus, 45 cm. longus, indumento paleaceo-ramentaceo fusco hirtus, ramulis 2-3 cm. longis. Bractea communis margine haud laciniato-barbata. Flos masculus 3 staminibus, connectivo crasso loculisque pendentibus. Floris foeminei ovarium initio subglobulosum vel turbinatum, deindeque gibbosum, stigmatibus lateralibus.

Forêt orientale, près de la rivière Anove, à 200 mètres d'altitude (P. B., sept. 1912, 12066).

12. — **DYPsis PLURISECTA** nov. sp.

Gracilis, caudice 7-8 mm. diam. Folia petiolo subnullo, 8-10 segmentis plus minus iræqualibus, lateralibus lanceo-

latis, angustis, 10-11 cm. longis, 17 mm. latis, longe acuminatis, basi decurrentibus (2-3 cm.), binis terminalibus leviter latioribus, 10 cm. longis, 20 mm. latis, basi (3 cm. 5, 4 cm.) in flabellum alte fureatum confluentibus. Spadix simpliciter ramosus, 8-10 ramulis gracilibus, puberulentis, 2-3 em. longis. Florum glomeruli bractea communis integra ; floris masculi 3 stamna brevi filamento, lato connectivo, loculis pendentibus.

Environ de Maroantsetra (P. B., 11966).

13. — **DYPsis MONOSTACHYA** nov. sp.

Gracilis, foliis longe (8 cm.) petiolatis, 8-10 segmentis, quorum bina terminalia trunca ta subdupo vel duplo lateralis latiora, basi decurrentia (3 cm.-3 cm. 5), lateralia angusta (12 mm.), acuminata, basi haud vel vix decurrentia. Spadix foliis brevior (25 cm.), indivisus, squamulis laciniatis conspersus ; flos masculus 3 staminibus, filamentis latis, in cupulam brevem basi connatis.

Bois des environs de Rantabé, dans la baie d'Antongil, vers 500 mètres d'altitude (P. B., oct. 1912. 12047). Espèce à rejets.

14. — **DYPsis MASOALENSIS** nov. sp.

Gracillima, 1 m. 50 alta, caudice 5-6 mm. diam., internodiis 2 em.-2 cm. 5 longis. Folia breviter (3 cm.) petiolata, 10-12 segmentis ovatis-sigmoideis, inæqualiter latis, valde decurrentibus, acuminatis, binis terminalibus apice truncatis, ibique extra denticulatis, in flabellum basi confluentibus. Spadix simpliciter vel duplo-ramosus, numerosis squamulis laciniatis vestitus, paucis ramulis sparsis, 3-4 cm. longis ; florum glomeruli bractea triangularis, margine laciniato-barbato.

Forêt de Masoala, vers 300 mètres (P. B., oct. 1912, 12034). Espèce à rejets.

15. — **DYPsis GRACILIS** Bory

Hauteurs de Tanambo, à Sainte-Marie (Boivin, 1851, herbier du Muséum de Paris, d'après M. Beccari).