

6—10 m hohe Palme, häufig, Wedel zum Dachdecken verwendet (Hopp n. 1327, 1333).

Geonoma anomoclada Burret nov. spec. — Petioli fragmentum visum 30 cm circ. longum, fere glabrum, usque 5 mm vix latum, supra canaliculatum, marginibus sat angustis. Rhachis 48 cm, lamina 67 cm longa, inter tenuiores. Nervi primarii utrinsecus 26—28. Segmenta in quoque latere 13—14, apicalia latissima, nervis primariis 7 percursa, 8—8,5 cm rhacheos amplectentia, 4—5 cm circ. inferne lata, 20 cm in margine superiore superantia, basilaria ambo angustiora, 2—3 cm lata, nervis primariis 6 percursa, praeter 2 utrinsecus nervis primariis 2 notata, reliqua omnia uninervia, anguste linearia, omnia falcata, acuminata, 8 mm circ. lata. Spadix simpliciter ramosus, ramis 8. Pedunculi fragmentum infra ramos situm 19,5 cm longum visum, sine spatharum annulis, bracteis late rotundatis paucis spiraliter dispositis, ut rami pilis albis, primo, ut videtur, densis vestitum, inferne nonnihil applanatum. Rami bractea late rotundata suffulti, 12—7 cm longi, inter tenuiores, ante anthesin visi axi 3 mm in diam. metiente, apice breviter spinosi. Foveae dense spiraliter dispositae, in seriebus paulo axin versus inclinatis 5, bilabiatae, marginibus tenuibus, labio inferiore vix inciso. Flores ♂ pro rata minores vel potius mediocres.

Colombia: Dep. Valle, über Bitaco, 1800 m, Urwald. Kleine Palme, Blüte unten, 2 m (11. September 1934 — Frau E. Dryander n. 29).

Die Art schließt sich verwandtschaftlich nahe an *G. Lindeniana* H. Wendl. und *G. linearifolia* Karst. an, vor denen sie sich durch die für diese Gruppe auffallend dünnen Äste und relativ kleinen Blüten auszeichnet.

Geonoma leptospadix Trail in Journ. of Bot. XIV (1876) 327, tab. 183, fig. II; Burret in Engl. Bot. Jahrb. LXIII (1930) 230.

Brasilien: Rio Manicorí, in den mittleren Rio Madeira. Bis 2 m hohe Palme. Früchte braun (W. Hopp n. 1326).

Geonoma Dryanderae Burret nov. spec. — Caudex 5 m altus, 12 cm in diam. metiens. Petiolus validus, 40 cm longitudine superans, supra nonnihil excavatus, 2 cm, ad apicem 1,2 cm latus, marginibus acutis, dorso late rotundatus, utrinque glaber. Rhachis 1,20 m circ. longa. Lamina 1,40 m circ. longa, ambitu oblonga, 55 cm circ. in diam., basi cuneata, apice excisa, rigida, colore utrinque i. s. subglauca, nervis primariis utrinsecus circ. 70 percursa, rhachis versus in nervis conspicue reduplicata, segmentis densis, ininterrupte