

3. G. bijugata. — Stipite erecto, arundinaceo; frondibus bijugatis; foliolis binis paribus, connexis, falcatis, inferioribus acuminatis, superioribus acutis; spadice ramoso, curvato, inferioribus frondibus exeunte.

Hab. *in locis inundatis superioris fluvii Jamundá ad Provincia Paraensi. Fructus sicci in Septembro.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 365).

Stipitis longitudo 2,^m5 et diamet. 0^m,01. Frondes 6 numero, patentes. Bacca elliptica.

4. G. brachyfoliata. — Stipite nullo. Frondibus pinatifidis; foliolis longis, linearibus, primis et extremis connexis, falcatis, acuminatis; rachis longitudine ferme dimidium foliolorum.

Hab. *locis udis et editis ad ripam fluvii Jamundá. Carebat fructibus Septembri.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 354).

Palma acaulis. Folia 5-6 contemporanea 1^m longa. Foliola 0,^m65 longa, prima et extrema connexa; ab altera parte 6, ab altera 8. Nullos vidi flores.

5. G. falcata. — Stipite nullo. Frondibus suberectis, interrupte-pinnatis; foliolis connexis, regulariter utrinque bipartitis, oblique insertis, falcatis, acuminatis.

Hab. *In iisdem locis ac praecedens. Nullas flores et fructus inveni.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 360).

Palma acaulis. Folia 5-6 contemporanea, 1^m,1 longa.