

**Geonomia campylostachys** Burret nov. spec. — „Caudex 20 cm altus.“ Frondes parvae, trijugae, basi cuneatim productae. Petiolus cum maxima parte vaginae 26 cm longus, tenuis, ad apicem 2 mm latus. Rhachis 25 cm longa. Lamina ambitu oblonga, usque 15,5 cm lata, tenuis, subtus paulo pallidior, nervis primariis utrinsecus 15. Segmenta utrinsecus 3, omnia porrecta, modice superne falcata, praeter supra omnia ambo longe anguste acuminata. Jugi medii segmenta quam reliqua praecipue quam infima ambo latiora, 4,5 cm in diam., nervis primariis 5 percursa, infima ambo 2—2,5 cm in diam., nervis primariis 3—4. Spadix simplex, parvus, pedunculo et spica inferne curvatis. Pedunculi fragmentum 6 cm longum visum, tenui. Spica parva, ad 8,5 cm longa, decidue furfuracea, sat laxa, inferne laxissima. Foveae spiraliter dispositae, bilabiatae, labium inferius sat productum, sub flore ♀ profunde fissum, labium superius leviter ab axi productum. Flores ♀ e foveis alte emergentes. Sepala ovata, ± carinata, extus longitudinem secus prominenter dense nervosa, i. s. brunnea, margine albida. Petala sepalis modice longiora, oblonga, apice obtusiuscula. Tubus staminodialis quam petala paulo longior, margine leviter crenatus.

Ost-Ecuador: Pastaza, Mera, sumpfiger Primärwald. Stämmchen 20 cm hoch auf kurzem Wurzelgerüst. Blütenstand kreisförmig nach unten gebogen, dunkel karminrot, Blüten weißlich (7. Sept. 1938 — Hertha Schultze-Rhonhof n. 2785).

Die Art ist am besten in der Verwandtschaft von *G. adscendens* und *G. helminthostachys* unterzubringen. Sie unterscheidet sich schon durch die kleinen Wedel und den kleinen Kolben mit kurzer Ähre und anscheinend nicht sehr langem Stiel. Besonders gegenüber *G. helminthostachys* sind die Fiedern stark sichelförmig gebogen, während wie bei dieser und im Gegensatz zu *G. adscendens* die Zahl der Primärnerven relativ gering ist. Auch von den Arten der Verwandtschaft von *G. arundinacea* und *G. Herthae* ist *G. campylostachys* gut geschieden.

**Geonomia cernua** Burret nov. spec. — „Caudex 0,5 m altus.“ Frons parva, ambitu oblongo-elliptica, usque 22 cm lata, nervis primariis utrinsecus 17 percursa, ± irregulariter 3- ad plurijuga. Petiolus usque ad vaginam 25,5 cm longus, i. s. ad apicem 3 mm latus, superne ut rhachis subtus cinereo- (an primo pallide fusco- ?) furfuraceus. Rhachis 33 cm longa, frondis visae in altero latere segmenta 3 longe dissita gerens, sat porrecta, ad apicem falcata, praeter apicale longe anguste acuminata, segmentum infimum 3,3 cm in maximum diam., nervis primariis 4, medium 5 cm in diam., nervis primariis 5, apicale