

der Schnabel stark exzentrisch, sehr kurz und stumpf, das Fruchterianth ist mehr als doppelt so groß. Der Samen von *H. Woodfordiana* ist höher als breit, der von *H. Kajewskii* breiter als hoch.

Heteropspathe ramulosa Burret nov. spec. — Caudex ex spadicis basi 6 cm vel modice ultra in diam. metiens. Frondis superioris fragmenta apicalia visa: Rhachis triangularis, minus in lateribus, praecipue subtus sat decidue fusco-furfuraceo-tomentosa, furfure delapso minute fusco-punctulata. Segmenta ∞ , pectinata, rhacheos apicem versus nonnihil longitudine, minus latitudine diminuentia, omnia anguste linearia, superne sensim angustata, apicibus plus minus destructis, ut videtur, brevibus, acutis, inaequaliter bifidis, fragmenti apicalis 50 cm fere longi segmenta infima visa 45 cm circ. longa, recta vel fere, maxima latitudine in dimidia inferiore sita 2,5 cm, sat rigida, utrinque glabra, punctulis fuscis carentia, praeter costam medium dextra sinistra nervis validis pluribus valde prominentibus, iisdem longitudinaliter conspicue plicata, nervo marginali nonnihil incrassato, nervis tertiaris sat numerosis, modice conspicuis. Spadix 80 cm longus, 3-plo multiramosus. Pedunculus robustus, 27 cm longus, rotundato-applanatus, inferne densissime, molliter fusco-tomentosus, ad basin 2,5 cm latus, spatha inferiore basilari, superiore 8 cm altius inserta, ex fragmanto extus in modo pedunculi vestita. Rhachis 46 cm longa, ramis primariis 15 ramosis, supremis circ. 12 simplicibus, parvis. Rhachis ut rami inferne fusco-furfuracei, longitudinaliter angulosi, ramuli fructiferi fere glabri. Rami et ramuli bractea triangulari suffulti, inferioribus saepe nonnihil productis, rami inferiores secundarios numerosos exserentes, secundarii inferiores iterum ramulis tertiaris pluribus. Ramuli fructiferi pro rata breves, spicae longiores ad 15 cm circ. metientes, siccae in dimidia circ. parte in internodiis 2 mm in diam. Florum glomeruli ex insertionibus usque ad ramulorum apicem fere 3-flori, flore ♀ intermedio, ♂ binis juxtapositis. Fructus in serobiculis conspicue excavatis, labio inferiore conspicuo, late rotundato notatis, bracteis sat evolutis rotundatis cincti, ovati, acuti, i. s. cum perianthio 9 mm et paululo ultra longi, 6 mm in parte inferiore lati, apice sat subito acutati, rostello crassiusculo, apice stigmatum discum gerente 1 mm in diam. metiente, extus sat dense sclerosomatibus nonnihil elevato-lineolati, basi abrupte breviter stipitati. Perianthium fructiferum fructui late rotundato arete accumbens, patelliforme, in ore 5 mm in diam. metiens, 3 mm altum, nervis vel nervulis prominentibus carens vel potius ad apicem petalorum fere inconspicuis. Sepala late tegentia, late rotundata, demum leviter fissa. Petala late rotundata, imbricata, demum fissa, apiculo late triangulari

sat obscuro. Pericarpium siccum $\frac{1}{2}$ mm vix in diam. metiens, ut videtur, carnosulum, fibris numerosis in lineolis sat longis sub epicarpi conspicue prominentibus. Semen ovatum, 6 mm altum, 4,5 mm latum, subapiculatum, basi late truncato-rotundatum. Rhaphe totum latus secus pertensa, linearis. Albumen sat profunde ruminatum, ruminationibus haud numerosis. Embryo basilaris.

Salomo-Inseln: Bougainville, Mororai, Uapu (P.). Stammumfang etwa 33 cm. Holz zu Speeren, Bogen usw. verwendet (J.H.L. Waterhouse y 131 in Herb. Kew).

Die Art ist besonders durch die relativ kurzen Fruchtäste sehr ausgezeichnet. Ihre Früchte sind eiförmig, spitz. Von den bisher bekannten Arten kommt keine in Frage, auch die wenigen mir nicht vorliegenden Arten lassen sich nach der Beschreibung zweifellos unterscheiden.

Gulubia costata Becc. var. **gracilior** Burret nov. var. — Palma alta, gracilis, caudice circ. 25 m et ultra alto, supra basin 25 cm in diam. superante, superne angustato, coma frondibus 16 efformata. Vagina circ. 75 cm longa, superne extus densissime, tactu molliter, sordide pallide brunneo-tomentosa. Petiolus 35 cm circ. longus, ut rhachis inferior supra nonnihil excavatus, marginibus acutis, dorso rotundatus, minutissime atro-fusco-lepidotus. Lamina circ. 2,2 m longa, segmentis regulariter dispositis. Rhachis, praecipue subtus, minutissime atro-fusco-punctulata. Segmenta infima angustissima, longissime acuminata, 40 cm circ. longa, sequentia sensim latiora, longiora, maxima visa mediae prob. rhacheos 80 cm fere longa, 3 cm lata, basi recurvata et a rhachi semipatentia, linearia, superne angustata et, ut videtur, modice acuminata; frondis apicem versus segmenta sensim angustiora, breviora, superne paulo angustata, haud acuminata, apice breviter bifida, apicibus brevibus, obtusiusculis, segmentis summis 2—3 tantum angustissimis, acutis. Costa media subtus inferne paleis linearibus, basi insertis praedita, in nervis nervulisque ut in facie oculo fortissime armato minutissime fusco-punctulata, in facie subtus plus minus minute tuberculata. Segmenta latiora nervis validioribus dextra sinistra pluribus, tenuibus numerosis. Spadix fructifer pro genere inter graciliores, 3-plo ramosus, 70 cm longus, glaber. Pedunculi pars caudicem amplectens 12 cm in diam. metiens, ceterum pedunculus 9—10 cm longus, transverse sectus ellipticus, 2—2,5 cm supra basin, 1,5 cm circ. ad apicem latus, glaber, spatharum annulis 2 atque bracteae cicatrice ulteriore semiannulari insculptus. Rami primarii usque 4,5 cm longi, applanati, rotundati, bractea basili valde