

pulgadas, con hojas mas anchas y gruesas, como coriáceas, menos largas, muy glabras en ambas caras, con frecuencia obtusamente tricúspidas en la punta, con la nerviosidad mediana mucho mas gruesa. Tallos sencillos ó bifurcados, mas profundamente estriados, hispídos ó glabrescentes. Invólucro muy hispido aun en la madurez. Pajitas del receptáculo muy largamente adelgazadas en una punta filiforme que alcanza la estremidad del vilano cuando maduro. Akenios fusiformes, oblongos, algo adelgazados en la punta, finamente arrugados en el traves.

15. *Achyrophorus acaulis*. †

A. rhizomate crasso, caule subnullo, foliis rosulatis, oblongis, basi attenuatis, pinnatifidis, glaberrimis, laciniis linearibus, acutis, integris vel rarius paucidentatis; capitulo magno, unico, inter folia subsessili; involucri squamis exterioribus latissimis, obcordatis, apice obtuso vix ciliatulis, intimis lanceolato-linearibus, nisi apice viridanti membranaceis, omnibus integerrimis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso y tallo tan corto que parece no existir. Hojas radicales dispuestas en roseta, tendidas, oblongas, adelgazadas en un peciolo membranoso, llano, mas ó menos profundamente pinatífidos, de una á dos pulgadas de largo, de como seis líneas de ancho, muy glabras en ambas caras, con la nerviosidad del medio bastante fuerte, y los segmentos lineares agudos, enteros, solitarios, ó á veces un poco dentados. Cabezuelas gruesas de una pulgada y media de alto á la madurez, de ocho y mas líneas de ancho, llevadas por un pedúnculo tan corto que parecen sésiles en el medio de la roseta de las hojas. Invólucro campanulado, formado de tres ó cuatro filas de escamas cuyas esterioreas son obcordiformes, de cerca de tres líneas de largo, algo mas largas que anchas, obtusas, muy enteras, glabras, á escepcion de la punta, en donde están muy poco pestañosas en sus márgenes; las interiores lanceoladas-lineares, obtusiúsculas, muy glabras, y enteras, casi enteramente membranosas, fuera del ápice, que es verdoso. Pajitas del receptáculo blanquizas, terminadas por una punta larga, en la base de la cual se observa con frecuencia dos dientes. Akenios recorridos por cinco surcos, finamente arrugados en traves, terminados por un pico largo y filiforme. Vilano muy largo y blanco.

Se cria en los prados pantanosos de las altas cordilleras de Talcalegue, provincia de Colchagua. Florece en febrero.