

quejugae $\frac{3}{4}$ lin. latae; pedunculis $3 - 3\frac{1}{2}$ -pollicaribus; squamis involueri circa 16, 9 lin. longae; paleae ejusdem formae, sed angustiores et saepe uno ultero de dente innitae. Achaenia erostria? juniora saltem nullum rostri vestigium exhibent. — Species squamis involueri acutissimis facile distinguenda.

232. **Achyrophorus araneanus** Ph. A. acaulis, radice crassa, multicipite, versus apicem nigro-squamosa; foliis hirtis, ambitu oblongo-linearibus, peracutis, dentatis aut pinnatifidis, dentibus lobisque acutis; pedunculis omnino nudis, folia aequantibus, floccosis aut glabratibus; squamis involueri latis, triangulari-lanceolatis, glabris aut margine praesertim floccosis, exterioribus dorso hispidis.

Prope Nahuelbuta in humidis 1835 legit cl. Gay (herb. no. 932.); in Andibus depart. Linares orn. Germain. — In specimine prioris radix 4 lin. crassa; folia 5 poll. longa, cum lobi 6 lin. lata, lobi non ultra lin. lati, rhachis 2 lin. lata. In specimenibus a Germainio lectis folia majora, latiora, usque ad 8 poll. longa, lobi 20 lin. longi, magis incisi, sed rhachis pariter modo 2 lin. lata. Involucrum 7 lin. altum, totidem latum, e squamis circa 34 compositum; paleae lineares, satis abrupte acuminatae; achaenia (juniora saltem) erostria.

233. **Achyrophorus spinuliger** Ph. A. caule squamigero, monocephalo, striato, tomento albo, fugace vestito; foliis radicalibus confertis, linearis-lanceolatis, in petiolam attenuatis, integerrimis, glabriusculis, subtus pareo hirtellis, margine spinuloso-ciliolatis; squamis involueri glabratibus, margine apicali floccoso-ciliolatis, exterioribus ovato-lanceolatis, interioribus oblongis, sensim angustatis, obtusiusculis; achaenias (junioribus saltem) erostribus.

In Andibus Talcuregne dictis legit cl. Gay. Herb. chil. no. 698. — Folia $3\frac{1}{2}$ poll. longa, $3\frac{1}{2}$ lin. lata; caulis 6-