

819. **Achyrophorus brevicaulis** Ph. A. glaber, foliis radicalibus rosulatis, oblongo-linearibus, acutis, subintegerimis; vel lobulato-dentatis; caule monocephalo, foliis vix longiore, foliis paucis linearibus, infimis semiamplexicaulibus, supremis bracteiformibus onusto; squamis involuci exterioribus hispidis, omnibus obtusis; paleis linearibus, sensim acuminatis; achaeniis breviter rostratis, praesertim exterioribus.

Prope Corral detexit orn. Krause. — Folia radicalia 30 lin. longa, 6—7 lin. lata, in petiolum brevem angustata. Caulis ad summum 5-pollicaris, plerumque modo tripollicaris, siccus sulcatus, sub flore panllolum incrassatus et hispidus. Involucrum 6 lin. longum. Paleae panlo breviores. — *A. andinus* DC. achaeniis exterioribus brevius rostratis convenit, sed canle elongato et squamis involuci paucioribus satis differt. *A. tenuifolius* DC. squamis involueri glabrescentibus etc., *A. Lessingii* Schultz Bip. foliis radicalibus hirsutis, achaeniis longe rostratis; *A. Jussieui* Schultz Bip. achaeniis peripheriae multo longioribus; *A. thrincoides* Remy caule basi nudo, foliis hispidis; *A. tenuifolius* Remy caule pedali etc. differunt.

820. **Achyrophorus angustissimus** Ph. A. glaberimus; caule monocephalo; nudo, foliis radicalibus linearibus integerimis, in petiolum longum attenuatis; squamis involuci paucis, anguste linearibus, achaeniis . . . (erostribis?).

Inter lacus Llanquihue et Todos los Santos invenit orn. Cox. — Caulis 14 poll. altus, tantummodo foliis duabus minutis, 3 lin. longis onustus. Folia radicalia majora ultra 4 poll. longa, modo $1\frac{1}{3}$ lin. lata; breviora 15 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, omnia integerima. Involucrum 8 lin. longum; squamis ad summum 24 constans, quarum nulla latitudinem 1 lin. aequat. Achaenia matura non adsunt. — Involuci squamis