

16. *Achyrophorus microphyllus*. †

A. rhizomate ramosissimo, foliis radicalibus, linearibus, angustis, sat brevibus, integerrimis vel remote denticulatis, acutis, basi attenuatis, glaberrimis; pedunculis radicalibus, longitudine foliorum, erectis, monocephalis, unica squama donatis, incano-tomentosis; involucri oblongi squamis pluriserialibus, ovali-oblongis, obtusis, parce ad margines lanatis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso, arrugado, escamoso, muy ramoso, negruzco, y sin tallos. Hojas enteramente radicales, paradas, lineares, angostas, agudas, adelgazadas por abajo y escariosas negruzcas en la base, muy enteras, ó bordeadas de algunos dientecitos poco acercados, muy glabros en ambas caras, de una consistencia algo gruesa, de una pulgada de largo, de una línea escasa de ancho. Pedúnculos derechos, solitarios, provistos de una sola escama en su longitud, cilíndricos, cubiertos de un vello tomentoso-blanquizco, terminados por una sola cabezuela de una pulgada de largo, es decir igualando las hojas ó sobrepujándolas un tanto con la cabezuela, que es oblonga. Invólucro formado de tres filas de escamas, cuyas exteriores son ovaladas-oblongas, obtusas, de un verde negruzco despues de secas, provistas en sus márgenes y en la nerviosidad del medio esterno de un vello lanudo-blanquizco corto y poco abundante, las interiores mas alargadas, glabrescentes, membranosas en sus márgenes. Pajitas del receptáculo finamente pestañosas en los bordes de la parte superior, y adelgazadas en una punta bastante larga.

Se cria muy tupida entre las piedras de las cordilleras de Ovalle, á una altura de 2,670 metros. Florece en diciembre y enero.

17. *Achyrophorus clarionoïdes*. †

A. rhizomate crasso, squamoso, caule nullo; foliis radicalibus, oblongis, acutis, pinnatifidis, basi attenuatis, glaberrimis, laciniis obovalibus vel linearibus, mucronulatis; pedunculis radicalibus, foliis longioribus, erectis, nudis, laxè subtomentosis, monocephalis; involucri oblongo-cylindrati squamis subuniseriatis, lineari-lanceolatis, dorso hispidis.

Planta sin tallo, vivaz, de como dos pulgadas de alto, con rhizoma grueso, cubierto al exterior y en su estremidad superior

de muchas éscamas negruzcas que son la parte inferior persistente de las hojas. Estas son enteramente radicales, paradas, oblongas, agudas, pinatífidas, adelgazadas en la base, negruzcas despues de secas, enteramente glabras en ambas caras, ligeramente coriáceas, de una á una pulgada y media de largo, de cuatro líneas á lo sumo de ancho, incluyendo las lacinias, que son obovaladas ó lineares, enteras, y todas terminadas por un pequeño mucron agudo. Pedúnculos radicales, derechos, cilíndricos, estriados en toda su lonjitud, enteramente desnudos, mas largos que las hojas, cubiertos de una lana blanca, poco abundante, terminados por una sola cabezuela oblonga-cilíndrica, de una y media á dos pulgadas inclusa la cabezuela. Invólucro formado de una sola fila de escamas lanceoladas-lineares, obtusas, híspidas en la nerviosidad del medio esterno, algo lanudas-blanquizas hácia la punta, de seis á ocho líneas de largo, de una á lo sumo de ancho en la base. Flores amarillas.

Se cria en los pastos de las cordilleras.

LII. ESCORZONERA. — SCORZONERA. *

Capitulum multiflorum. Involucrum imbricatum. Receptaculum nudum. Achænium in rostrum sensim attenuatum, estipitatum, callo basilari hilum cingente brevissimo. Pappus pluriserialis, conformis, plumosus aut rarius scaber.

SCORZONERA Linn. — DC. — Lessing.

Estas plantas tienen las raices fusiformes ó tuberculosas, las hojas las mas veces enteras, y las flores casi siempre, amarillas, á veces purpúreas. Cabezuelas multiflores. Invólucro formado de escamas imbricadas. Receptáculo desnudo. Lígulas con cuatro ó cinco dientes. Akenios no estipitados, ligeramente adelgazados en un pico, provistos de una areola lateral. Vilano formado de varias filas de pelos plumosos ó raravez denticulados, iguales entre sí.

Este jénero, cuyas especies son bastante abundantes en Europa, ofrece en Chile solo la especie cultivada.