

basi glandulosus glaber, superius arachnoideus; foliis radicalibus emarginatis; caulinis decurrentibus, oblongis, sinuato-lobatis; lobis latis, hinc inde mucronato-dentatis, utrinque 3 ad 5, in foliis inferioribus late-triangularibus, in foliis supremis angustioribus supra glanduloso-asperis, junioribus subtus arachnoideis; nervo mediano valde prominente; capitulis ad apicem ramorum 3 — 6, sessilibus aut breviter pedunculatis, bractea linearis integerrima basi fultis, 8 lin. longis; squamis involueri 5 lin. longis.

230. *Leuceria foliosa* Ph.

Unicum specimen, idque nondum bene florens et parte inferiore caulis destitutum ex intimis Andibus prov. *Santiago* attulit orn. Germanus. — Caulis perennis et ultra pedalis fuisse videtur, dense glanduloso-pilosus et ramosus est. Folia usque ad $3\frac{1}{2}$ poll. longa; $1\frac{3}{4}$ poll. lata, internodia bis aequantia, sessilia; semiamplexicaulia, superiora basi cordata, ovata, grosse sinuato-dentata, dentibus utrinque 3—5. Capitula solitaria, terminalia, diam. 9 lin.; pedunculi ab ultimo folio inde $1\frac{1}{2}$ poll. longi, bracteis 2 vel 3 onasti, quarum supremae forma et magnitudine cum squamis exterioribus involueri convenient. Hae squamae 5 lin. longae, glanduloso-hirtae. Pappus niveus, florensis nondum apertis fere longior.

231. *Achyrophorus montanus* Ph. A. acaulis; radice crassa, multicipite; foliis omnibus radicalibus, glabris, ambitu oblongis, profunde pinnatifidis; lobis linearibus, rhachis latitudine aequantibus, integerrimis aut lobatis; pedunculo uno, glaberrimo aut glabro, haud striato, folia bis aequante, apice sicut involucrum setis purpureis plus minusve hispido; squamis involueri a basi ad apicem sensim angustatis, acutissimis.

In Andibus interioribus prov. *Santiago* legit Germanus. Folia 2 poll. longa, 6 lin. lata; rhachis et laciniae subquino-

quejugae $\frac{3}{4}$ lin. latae; pedunculis $3 - 3\frac{1}{2}$ -pollicaribus; squamis involueri circa 16, 9 lin. longae; paleae ejusdem formae, sed angustiores et saepe uno ultero de dente innitae. Achaenia erostria? juniora saltem nullum rostri vestigium exhibent. — Species squamis involueri acutissimis facile distinguenda.

232. **Achyrophorus araneanus** Ph. A. acaulis, radice crassa, multicipite, versus apicem nigro-squamosa; foliis hirtis, ambitu oblongo-linearibus, peracutis, dentatis aut pinnatifidis, dentibus lobisque acutis; pedunculis omnino nudis, folia aequantibus, floccosis aut glabratibus; squamis involueri latis, triangulari-lanceolatis, glabris aut margine praesertim floccosis, exterioribus dorso hispidis.

Prope Nahuelbuta in humidis 1835 legit cl. Gay (herb. no. 932.); in Andibus depart. Linares orn. Germain. — In specimine prioris radix 4 lin. crassa; folia 5 poll. longa, cum lobi 6 lin. lata, lobi non ultra lin. lati, rhachis 2 lin. lata. In specimenibus a Germainio lectis folia majora, latiora, usque ad 8 poll. longa, lobi 20 lin. longi, magis incisi, sed rhachis pariter modo 2 lin. lata. Involucrum 7 lin. altum, totidem latum, e squamis circa 34 compositum; paleae lineares, satis abrupte acuminatae; achaenia (juniora saltem) erostria.

233. **Achyrophorus spinuliger** Ph. A. caule squamigero, monocephalo, striato, tomento albo, fugace vestito; foliis radicalibus confertis, linearis-lanceolatis, in petiolam attenuatis, integerrimis, glabriusculis, subtus pareo hirtellis, margine spinuloso-ciliolatis; squamis involueri glabratibus, margine apicali floccoso-ciliolatis, exterioribus ovato-lanceolatis, interioribus oblongis, sensim angustatis, obtusiusculis; achaenias (junioribus saltem) erostribus.

In Andibus Talcuregne dictis legit cl. Gay. Herb. chil. no. 698. — Folia $3\frac{1}{2}$ poll. longa, $3\frac{1}{2}$ lin. lata; caulis 6-