

obtusiusculis glabris; ligulis pluriseriatis luteis; achæniis erostribus, pappo dimidio fere æquilongis.

A. Meyenianus Wlprs., *Repert.*, VI, 336. — Oreophila taraxacoides Meyen et Wlprs., in *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. Carol.*, XIX, suppl. 1, 294.

β *ciliatus* : foliis squamisque involucri magis minusve ciliatis.

Plante polymorphe, ayant à peu près le même port que l'*A. quitensis* dont elle diffère essentiellement par ses feuilles roncînées et quelquefois ciliées. Les lobes de celles-ci varient surtout extrêmement, et je ne serais pas surpris que les botanistes qui n'auraient sous les yeux que des formes extrêmes n'en fissent plusieurs espèces différentes.

Hab. Pérou : pâturages des hautes Cordillères des départements de Puno!, d'Arequipa! et de Tacna! (Meyen, Wedd.). — Bolivie : dans les régions élevées des départements de Potosi!, de Chuquisaca! et de Tarija! (d'Orbigny, Wedd.).

3. ACHYROPHORUS ERIOLÆNUS.

A. a præcedente foliis vix runcinatis nervoque medio subtus pilis crassis ciliato, necnon squamis involucri albo-lanatis distinctus; ligulis pluriseriatis, albidis; achæniis...

A. eriolænus Schultz Bip., in *Bonplandia*, ann. 1855, p. 236; et ann. 1856, p. 54.

Hab. Pérou : dans les pâturages, aux environs d'Azangaro, avec l'espèce précédente (Lechler, *exsicc.*, n. 1754), Cordillères de Cuzco! (Gay).

OBS. — Je n'ai pas vu la plante de Lechler, mais j'ai eu sous les yeux trois capitules d'*Achyrophorus* recueillis par M. Gay dans les Cordillères de Cuzco et qui se rapportent bien à la description de M. Schultz, en ce que les bractées de l'involucre sont revêtues, dans leur partie supérieure, d'un tomentum blanc assez épais; caractère qui permettrait de distinguer cette espèce à première vue de toutes les autres et notamment de la suivante, dont les feuilles sont également ciliées. L'une et l'autre de ces espèces paraissent se distinguer de l'*A. Meyenianus* par leurs ligules blanches ou bleuâtres.

4. ACHYROPHORUS SETOSUS.

A. exscapus; rhizomate subsimplice, crassiusculo; foliis rosulatis, elliptico-lanceolatis, sinuatis, utrinque glabris aut supra parce setosis, margine magis minusve (interdum densissime) ciliatis; capituli sessilis involucreo subcampanulato, squamis sub-6-seriatis, exterioribus ovatis oblongisve obtusis apice et medio dorso plus minus setosis; ligulis pluriseriatis, albidis.

Hab. Pérou : lieux marécageux des hautes Cordillères du département de Lima, au Cerro de Pasco!, etc. (Mac Lean). — Bolivie : environs de Potosi! (d'Orbigny) et parties élevées de la province de Cinti! (Wedd.).

5. ACHYROPHORUS CRYPTOCEPHALUS.

A. exscapus; rhizomate subsimplice, crasso; foliis rosulatis, basi interiore longe sericeo-pilosis; capitulo majusculo, inter folia latente et ideo vix conspicuo.

A. cryptocephalus Schultz Bip., in *Bonplandia*, ann. 1856, p. 54.

Hab. Pérou : province de Carabaya, au sommet de la Cordillère d'Ayapata (Lechler, *exsicc.*, n. 1963).