

Se cria en las provincias de Valdivia y Chiloe, donde está conocida con el nombre de scorsonera, lo mismo que otras muchas especies de este jénero.

14. *Achyrophorus spathulatus*. †

A. caule basi simplici, in medio bifurco, ramis monocephalis; foliis radicalibus rosulatis, oblongo-late spathulatis, obtusissimis, parce subcrenato-dentatis, utrinque hispidis; caulinis inferioribus paucis, ovalibus, integerrimis, summis bracteiformibus; involucri fulvo-hispidi squamis oblongo-lanceolatis, obtusissimis, interioribus membranaceo-late-marginatis.

Vulgarmente *Escorzonera*.

Var. β . *chiloensis* †.

A. spathulatus foliis paulo brevioribus, latioribusque, utrinque glaberrimis, subcoriaceis, nervo medio crassiore, caulibus profundius striatis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso por las cicatrices anulares, por el vestigio de los antiguos verticilios de las hojas, con tallos de seis á ocho pulgadas y tal vez mas de altura, saliendo varios del mismo rhizoma, sencillos en la base, bi ó trifurcados en la mitad de su largo, cilíndricas, finamente estriadas, hispidiúsculas ó glabrescentes. Ramos de las bifurcaciones terminados por una sola cabezuela. Hojas radicales dispuestas en roseta, tendidas, de tres á cinco pulgadas de largo, de ocho á once líneas de ancho, oblongas-espatuladas, obtusas-redondas en la punta, adelgazadas en la parte inferior en un peciolo llano y dilatado en la base, bordeadas de almenajes poco profundas y muy distantes unas de otras, cubiertas en ambas caras de pequeños pelos escariosos poco acercados, con la nerviosidad del medio acompañada de otras varias nerviosidades paralelas; las tallinas poco numerosas, sésiles, las inferiores ovaladas, muy enteras, las superiores mas ó menos lineares y parecidas á brácteas. Cabezuelas gruesas, de una pulgada de largo, y de seis á ocho líneas de ancho. Invólucro cubierto de pelos leonados, numerosos, con escamas oblongas, larga é insensiblemente adelgazadas en la punta, muy obtusas, las interiores anchamente membranosas en sus márjenes. Lígulas amarillas, mucho mas largas que el invólucro.

Se cria en la provincia de Colchagua, San Fernando, etc., y en Chiloe, donde se encuentra una variedad β *chiloensis*, cuyo bohordo es de tres á seis

pulgadas, con hojas mas anchas y gruesas, como coriáceas, menos largas, muy glabras en ambas caras, con frecuencia obtusamente tricúspidas en la punta, con la nerviosidad mediana mucho mas gruesa. Tallos sencillos ó bifurcados, mas profundamente estriados, hispídos ó glabrescentes. Invólucro muy hispido aun en la madurez. Pajitas del receptáculo muy largamente adelgazadas en una punta filiforme que alcanza la estremidad del vilano cuando maduro. Akenios fusiformes, oblongos, algo adelgazados en la punta, finamente arrugados en el traves.

15. *Achyrophorus acaulis*. †

A. rhizomate crasso, caule subnullo, foliis rosulatis, oblongis, basi attenuatis, pinnatifidis, glaberrimis, laciniis linearibus, acutis, integris vel rarius paucidentatis; capitulo magno, unico, inter folia subsessili; involucri squamis exterioribus latissimis, obcordatis, apice obtuso vix ciliatulis, intimis lanceolato-linearibus, nisi apice viridanti membranaceis, omnibus integerrimis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso y tallo tan corto que parece no existir. Hojas radicales dispuestas en roseta, tendidas, oblongas, adelgazadas en un peciolo membranoso, llano, mas ó menos profundamente pinatífidos, de una á dos pulgadas de largo, de como seis líneas de ancho, muy glabras en ambas caras, con la nerviosidad del medio bastante fuerte, y los segmentos lineares agudos, enteros, solitarios, ó á veces un poco dentados. Cabezuelas gruesas de una pulgada y media de alto á la madurez, de ocho y mas líneas de ancho, llevadas por un pedúnculo tan corto que parecen sésiles en el medio de la roseta de las hojas. Invólucro campanulado, formado de tres ó cuatro filas de escamas cuyas esteriorees son obcordiformes, de cerca de tres líneas de largo, algo mas largas que anchas, obtusas, muy enteras, glabras, á escepcion de la punta, en donde están muy poco pestañosas en sus márgenes; las interiores lanceoladas-lineares, obtusiúsculas, muy glabras, y enteras, casi enteramente membranosas, fuera del ápice, que es verdoso. Pajitas del receptáculo blanquizas, terminadas por una punta larga, en la base de la cual se observa con frecuencia dos dientes. Akenios recorridos por cinco surcos, finamente arrugados en traves, terminados por un pico largo y filiforme. Vilano muy largo y blanco.

Se cria en los prados pantanosos de las altas cordilleras de Talcaegue, provincia de Colchagua. Florece en febrero.