

quejugae $\frac{3}{4}$ lin. latae; pedunculis $3 - 3\frac{1}{2}$ -pollicaribus; squamæ involueri circa 16, 9 lin. longæ; paleæ ejusdem formæ, sed angustiores et saepe uno ultero de dente munitæ. Achaenia erostria? juniora saltem nullum rostri vestigium exhibent. — Species squamis involueri acutissimis facile distinguenda.

232. Achyrophorus araucanus Ph. A. acaulis, radice crassa, multicipite, versus apicem nigro-squamosa; foliis hirtis, ambitu oblongo-linearibus, peracutis, dentatis aut pinnatifidis, dentibus lobisque acutis; pedunculis omnino nudis, folia aequantibus, floccosis aut glabratis; squamis involueri latis, triangulari-lanceolatis, glabris aut margine praesertim floccosis, exterioribus dorso hispidis.

Prope *Nahuelbuta* in humidis 1835 legit cl. Gay (herb. no. 932.); in Andibus depart. *Linares* orn. Germain. — In specimine prioris radix 4 lin. crassa; folia 5 poll. longa, cum lobi 6 lin. lata, lobi non ultra lin. lati, rhachis 2 lin. lata. In speciminibus a Germainio leetis folia majora, latiora, usque ad 8 poll. longa, lobi 20 lin. longi, magis incisi, sed rhachis pariter modo 2 lin. lata. Involuerum 7 lin. altum, totidem latum, e squamis circa 34 compositum; paleæ lineares, satis abrupte acuminatae; achaenia (juniora saltem) erostria.

233. Achyrophorus spinuliger Ph. A. caule squamigerō, monocephalo, striato, tomento albo, fugace vestito; foliis radicalibus confertis, lineari-lanceolatis, in petiolum attenuatis, integerrimis, glabriusculis, subtus parce hirtellis, margine spinuloso-ciliolatis; squamis involueri glabratis, margine apicali floccoso-ciliatis, exterioribus ovato-lanceolatis, interioribus oblongis, sensim angustatis, obtusiusculis; achaenii (junioribus saltem) erostribus.

In Andibus *Talcaregue* dictis legit cl. Gay. Herb. chil. no. 698. — Folia $3\frac{1}{2}$ poll. longa, $3\frac{1}{2}$ lin. lata; caulis 6-

pollicaris; squamæ caulinæ 3, inferior modo $3\frac{1}{2}$ lin. longa. Squamæ involueri circa 30, latiores quam in affinibus, nam illæ secundæ seriei 4 lin. longae, $2\frac{1}{2}$ lin. latae; interiores 7 lin. longae, $1\frac{1}{2}$ lin. latae. — *A. coronopifolius* ex descriptione squamis involueri angustis; *A. andinus* eodem charactere et achaeniis rostratis; *A. tenuifolius*, cui proxime accedere videtur, squamis involueri longe angustioribus differt.

234. Erigeron andinus Ph. E. caule humili, simplici, monocephalo, foliato, pilis albis patentibus hispido; foliis radicalibus confertis, elongatis, linearibus, basin versus attenuatis, obtusis, integerrimis, glabris, longe ciliatis; caulinis basi latioribus, sessilibus; squamis involueri linear-i-lanceolatis, acutis, glabris, glanduloso-hirtis, asperis.

In Andibus prov. *Santiago* occurrit. — Folia radicalia usque ad 3 poll. longa, 2 lin. lata; caulis 3—5 poll. altus; folia caulinæ circa 6, mediana 16 lin. longa, $1\frac{1}{4}$ lin. lata; squamæ involueri $2\frac{1}{2}$ lin. longae, apice atropurpureæ; ligulae roseæ involucrum bis aequant. — *E. andicola* DC. foliis brevioribus, utrinque hispidis, squamisque involueri hispidis differt.

235. Erigeron ciliaris Ph. E. caule humili, simplici, monocephalo, foliato, pilis albis praesertim superius hispido; foliis anguste-linearibus, acutis, glaberrimis, margine eleganter pectinato-ciliatis; radicalibus erectis, basi vix attenuatis, fere filiformibus; caulinis basi latioribus, sensim angustatis; squamis involueri linearibus, sensim angustatis, acutis hispidis.

In Andibus depart. *Linares* invenit orn. Germain. — Caulis $2\frac{1}{2}$ — 3 poll. altus, foliis 5—6 fere usque ad capitulum vestitus; folia radicalia usque ad $2\frac{1}{4}$ poll. longa, $\frac{3}{4}$ lata; versus apicem non latiora; caulinæ mediana fere pol-