

ladas, obtusas, adelgazadas por abajo, lobuladas-dentadas, con las divisiones obtusas-redondas, erizadas de pelitos en ambas caras y sobretodo en la superior, de como una pulgada y media de largo y de dos á tres líneas de ancho. Cabezuela única en cada tallo, con las lígulas amarillas, mucho mayores que las escamas del invólucro, que son oblongas, obtusiúsculas, cubiertas en la nerviosidad mediana esterna de pelos leonados-lustrosos; las interiores mas largas, membranosas en las márgenes.

Se cria en los cerros de San Fernando, donde florece en febrero.

13. *Achyrophorus tenerifolius*. †

A. caule simplici vel pauciramoso, glaberrimo nisi apice; foliis radicalibus lanceolato-linearibus, basi in petiolum longum attenuatis, glaberrimis, teneris, lobato-pinnatifidis, lobis angustis, obliquis; caulinis linearibus, subintegerrimis; involucri squamis exterioribus obtusissimis, dorso rufescente pilosis, interioribus margine membranaceis.

Planta vivaz de mas de un pié de alto, con rhizoma grueso, tortuoso, y los tallos levantados, sencillos ó bifurcados en la parte superior, muy glabros, á escepcion de la parte inferior del invólucro, donde son hispídos, lijeramente estriados, vestidos de unas pocas hojas, mientras que las radicales son muchas, lanceoladas lineares, adelgazadas en un largo peciolo dilatado-membranoso en la base, de tres á cinco pulgadas de largo, de tres á seis líneas de ancho incluyendo sus segmentos, muy lampiñas, membranosas-delgadas, á lo menos despues de secas, mas ó menos profundamente lobuladas-pinatífidas, con los segmentos alternos, lineares, enteros, distantes, oblicuos-ascendentes, en número de siete á nueve en cada hoja; las tallinas sésiles, poco numerosas, lineares-angostas, paradas, débilmente dentadas ó las mas veces muy enteras. Cabezuelas solitarias en la estremidad del tallo y de sus ramos, de ocho á nueve líneas de largo, de cuatro á cinco de ancho. Invólucro cubierto al exterior de pelos leonados, lustrosos, con escamas exteriores lanceoladas, muy obtusas, las interiores anchamente membranosas en sus márgenes. Lígulas amarillas, casi la mitad mas largas que el invólucro.

Se cria en las provincias de Valdivia y Chiloe, donde está conocida con el nombre de scorsonera, lo mismo que otras muchas especies de este jénero.

14. *Achyrophorus spathulatus*. †

A. caule basi simplici, in medio bifurco, ramis monocephalis; foliis radicalibus rosulatis, oblongo-late spathulatis, obtusissimis, parce subcrenato-dentatis, utrinque hispidis; caulinis inferioribus paucis, ovalibus, integerrimis, summis bracteiformibus; involucri fulvo-hispidi squamis oblongo-lanceolatis, obtusissimis, interioribus membranaceo-late-marginatis.

Vulgarmente *Escorzonera*.

Var. β . *chiloensis* †.

A. spathulatus foliis paulo brevioribus, latioribusque, utrinque glaberrimis, subcoriaceis, nervo medio crassiore, caulibus profundius striatis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso por las cicatrices anulares, por el vestigio de los antiguos verticilios de las hojas, con tallos de seis á ocho pulgadas y tal vez mas de altura, saliendo varios del mismo rhizoma, sencillos en la base, bi ó trifurcados en la mitad de su largo, cilíndricas, finamente estriadas, hispidiúsculas ó glabrescentes. Ramos de las bifurcaciones terminados por una sola cabezuela. Hojas radicales dispuestas en roseta, tendidas, de tres á cinco pulgadas de largo, de ocho á once líneas de ancho, oblongas-espatuladas, obtusas-redondas en la punta, adelgazadas en la parte inferior en un peciolo llano y dilatado en la base, bordeadas de almenajes poco profundas y muy distantes unas de otras, cubiertas en ambas caras de pequeños pelos escariosos poco acercados, con la nerviosidad del medio acompañada de otras varias nerviosidades paralelas; las tallinas poco numerosas, sésiles, las inferiores ovaladas, muy enteras, las superiores mas ó menos lineares y parecidas á brácteas. Cabezuelas gruesas, de una pulgada de largo, y de seis á ocho líneas de ancho. Invólucro cubierto de pelos leonados, numerosos, con escamas oblongas, larga é insensiblemente adelgazadas en la punta, muy obtusas, las interiores anchamente membranosas en sus márjenes. Lígulas amarillas, mucho mas largas que el invólucro.

Se cria en la provincia de Colchagua, San Fernando, etc., y en Chiloe, donde se encuentra una variedad β *chiloensis*, cuyo bohordo es de tres á seis