

NOVOS NOMES E NOVAS COMBINAÇÕES

tulis, integris vel 1-4 dentibus plus minusve prominentibus margine distale, terminale parvo triangulare; petiolus ca. dimidio laminae, apterus gracilisque. Scapi 12-25 × 0.2-0.3 cm, superne purpurascentes. Capitulum 30-40 mm diam.; involucrum 13-17 mm longum, bracteis externis 8-9 × 2.2-2.5 mm, patuli-reflexis. Cypselae corpus 2.8-3 mm longum, fulvum, superne spinulosum, conus 0.5-0.6 mm, rostrumque 6-7 mm longum.

Hab. in Insulis Azoricis Pico et Terceira dictis.

Typus: Ilha do Pico: S. Mateus, alt. 50 m, 31 Jan. 1963, I. Botelho Gonçalves 865 (LISI).

(J. Franco & M. L. Rocha Afonso)

P. 543 — *Andryala arenaria* (DC.) Boiss. & Reuter (b) ssp. *parvipila* Franco, ssp. nov.

A typo speciei recedit involucro pilis simplicibus glandulosis 0.5-0.8 mm longis, infuscatis vel flavis.

Hab. in soli cessatione vel aridis, plus minusve arenosis sed non littoreis, Lusitaniae centralis australisque.

Typus: Almeirim: Raposa, Herdade do Monte da Vinha, alt. 50 m, montados de sobre em solo de Pliocénico, 14 Mai. 1954, J. M. Boieiro (LISI).

(J. Franco, comb. nov.)

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —

— 574 —