

29. COMPOSITAE.

I. SEMIFLOSCULOSAE. XVII. ANDRYALA; a.

29. COMPOSÉES.

I. SÉMIFLOSCULEUSES. XVII. ANDRYALE; a.

4.

ANDRYALA CORONO-
PIFOLIA.

Tabula 92.

Character.

Fuscescenti - tomentosa, foliis calvescens pinnatifidis.

Diagnosis.

Caulis erectus, subangulatus, ramosus, tenuissime tomentosus. Folia radicaria in petiolum angustata, superiora sessilia, omnia pinnatifida, laciniis angustis, acutis; virentia, tenui - tomentosa; summa integrata. Panicula laxa, pedunculis tomentosis. Peranthodium dense tomentosum, phyllis linearibus. Corollae flavae. Annua.

ANDRYALE A FEUILLES
DE CORONOPE.

Planche 92.

Caractère.

Couverte d'un duvet brunâtre. Feuilles dégarnies, pinnatifides.

Diagnose.

Tige dressée, presqu'angulée, rameuse, à duvet très - mince. Feuilles radicales rétrécies en pétiole, supérieures sessiles, toutes pinnatifides, à lanières étroites, aigues; verdâtres, à duvet mince; suprèmes intégrées. Panicule lache, à pédoncules tomenteux. Peranthode à duvet serré; phylles linéaires. Corolles jaunes. Annuelle.

NOM PORTUGAIS systématique: ANDRYALA CORONOPIFOLIA.

LIEU NATAL. Près de *Braga*, sur les murs.

FLORAISON. Mai.

Explication de la Planche 92.

Fig. 1. Le peranthode coupé perpendiculairement par le milieu, et dégarni des fleurs, pour faire voir le réceptacle velu.

Fig. 2. Une fleur.

Fig. 3. La même grossie.

Fig. 4. Une semence avec l'aigrette.

Fig. 5. Idem grossie.

OBSERVATION.

Il est possible que cette plante soit une Variété de l'*Andryale colorée*.

DESCRIPTIO.

Fortassis Varietas *Andr. allochroae*, at multo minus tomentosa ac hirsuta.

Caulis 2 ped. altus, superne magis tomentosus. *Folia* caulina multa, 2 — 3 unc. longa, laminâ mediâ 2 — 3 lin. tantum latâ, laciniis $\frac{1}{2}$ — 1 lin. latis. *Pedunculi* magis tomentosi. *Peranthodium* dense tomentosum, at pilis paucis intermixtis. *Anthodium* paullo minus quam in *Andr. allochroa*.



Andryala coronopifolia.

Printed by G. W. Fotherby

Andryale à feuilles de Coronope.

Gravé par A. Ollier.