

DCCCXLII. ANDRYALA Linn. gen. n. 915. DC. fl. fr. ed. 3. v. 4. p. 56. — *Eriophorum* Paill. oct. acad. par. 1771. — *Forstium* Adans. fam. 2. p. 112. — *Andryala* et *Voigia* Roth in *Ust. mag.* 9. p. 17. — *Andryala* et *Rothia* Schreb. gen. n. 1240 et 1241. Willd. sp. 3. p. 1611. Cass. dict. 25. p. 64, 66. p. 311. Less. syn. p. 141.

Capitulum multiflorum. Invol. campanulatum, squamis numerosis linearibus 1-serialibus, nonnullis exterioribus accessoriis. Recept. alveolatum, alveolis simbrilliferis in setas productis, interdum in ambitu paleaceum. Achænia obovato-oblonga 10-striata erostris. Pappus pilosus scaber faciliè deciduus 1-serialis rigidulus. — Herbar. ploræque australi-Europæ hiennes aut perennes, tomento brevi stellato-velutino et pilis apice glandulosis præsertim in partibus superioribus donatæ. Capitula flava sepilis corymbosa.

Sect. 1. EUANDRYALA. — *Andryala* Roth. Schreb. Less. Cass.

Recept. ebracteolatum. Achænia omnia pappigera.

1. A. AGARDHII (Hensel. herb. ex Boiss. pl. exs.) cespitosa humilis basi suffruticosa multiceps, foliis radicalibus petiolatis ellipticis integerrimis utrinque tomento conferto brevi canis, caulibus simplicibus 1-cephalis folia 1-3 linearia sessilia gerentibus tomentosâ supernè et involuero pilis nigris glandulosis hispidis. ♀ in summis Sierra Tejada frequens, et in Sierra Nevada Hisp. Granat. rara. Species distinctissima. Caulis 4-pollicares foliis duplò longiores. (v. s. comm. à cl. Boiss.)

2. A. RAGUSINA (Linn. sp. 1136), tota tomento brevi velutino conferto incanescentis seu rufescens, caulibus erectis aut subdiffusis ramosissimis, foliis infer. lyrato-pinnatifidis, mediis acutè dentatis, summis integerrimis, capitulis longè pedicellatis laxissimè corymboso-pariculis, invol. squamis linearisubulatis dorso convexis. ♀ in agro Ragusino (Herm.), in insulis Archipelagi (Linn.). Herm. lugl. 6. p. 673. ic. Mill. icon. 97. t. 146. f. 2. (v. s. c.)

♂. *lyrata*, foliis infer. obtusè lyrato-pinnatifidis, caulibus obtusiusculè dentatis. ♀ in arenosis secus flumina ripas agri Narbonensis et Ruscinonensis. Andr. lyrata Pourr. act. tool. 3. p. 308. DC. fl. fr. suppl. p. 445. Benth. cat. p. 60. Andr. laciniata Lam. dict. 1. p. 153. Rothia argentea Lapeyr. abr. 485. — Clus. hist. 2. p. 143. ic. Lob. ic. 231. f. 2. Achænia ut in α et γ omnia papposa. Recept. omninò epaleaceum. (v. v. et s. sp.)

γ. *incana*, foliis infer. dentatis, caulibus ferè omnibus integerrimis acutissimis, capitulis minoribus. ♀ in valle Pyrenæicâ Gistain. Crepis incana Lapeyr. abr. 483. Andr. incana DC. fl. fr. suppl. p. 445. (v. s.)

γ. *ramosissima* (Boiss. in ed.), foliis inferioribus acutè semipinnatifidis, caulibus infer. dentatis, saper. integerrimis, caule ramosissimo. ♀ in colibus siccis et calcareis maritimis regni Granatensis usque ad 5000 ped. altit. legit cl. Boissier. (v. s.)

3. A. MACROCEPHALA (Boiss. in ed.), tota tomento denso albido cana eglandulosa, caule erecto apice ramoso-subcorymboso, foliis oblongis subacuminatis basi cuneatis et lobis paucis acutis semipinnatifidis, invol. tomentoso 1-seriali aut bracteolis 1-3 stipato. ♀ ad torrentes littorales regni Granatensis legit cl. B. Boissier. Capitula diam. pollicari, nempe duplò quàm in aliis speciebus ampla. (v. s. comm. à cl. inv.)

4. A. PINNATIFIDA (Ait. kew. 3. p. 129. excl. var. α), tota pube brevi mollè confertâ tomentosa, invol. pilos nigros rigidos pilis minùs confertos gerente, caule erecto ramoso, foliis caulibus semisimplexicaulibus variè pinnatifidis inciso-dentatisve, lobis dentibusve obtusis. (♂) in rupetibus et aridis ins. Teneriffæ. A. pinnatifida et verisim. coronopifolia et cheiranthifolia Link in Buch cas. Variat tomento denso et pariori, foliis oblongis aut elongatis,