

ascendantes, simples ou peu rameuses, naissant d'une souche cespiteuse vivace, qui émet aussi des rosettes stériles. — Fl. mai.

Plateau d'Asfour.

Jasione stricta Pom. (*perennes*).

La variété hispidule diffère du type par les divisions du calice longuement subulées-sétacées et non brièvement subulées ; les feuilles semblablement marginées, sont plus ondulées. C'est peut-être une espèce distincte.

Djebel Fortas, près Blidah ; Beni-Ournid de Tlemcen (Havard).

Andryala Reboudiana.

Calathides pédonculées en panicule pauciflore. Péricline à tomentum court velouté, mêlé de poils glanduleux qui le dépassent à peine, à folioles convexes assez longuement dépassées par les ligules d'un jaune d'or. Akènes oblongs bruns, à côtes plus claires, fines, terminées en dent courte à peine étalée. Feuilles radicales linéaires oblongues, obtuses, atténuées en pétiole ailé ; les caulinaires sessiles oblongues, arrondies à la base plus ou moins élargie en lobules, à bords un peu sinués ; les plus supérieures linéaires. Tige dressée, simple, bien feuillée. Racine grêle annuelle. Plante toute couverte d'un tomentum court et cendré. — Fl. mai.

Région saharienne : Oued el-Arab (Reboud).

Andryala oestivalis.

Calathides pédonculées en corymbe lâche. Péricline à tomentum court subfloconneux, mêlé de longs poils jaunes glanduleux, à folioles notablement dépassées par les ligules jaunes. Akènes bruns discolores, oblongs, à côtes épaisses lisses, terminées en une corne étalée. Réceptacle pileux. Feuilles radicales en rosette, linéaires, atténué en pétiole