

dentatis aut varie pinnatifidis, lobis dentibnsve obtusis, invol. nunc toto nigris pilis obsito nunc glabriuscule. Recept. paleis omnino destitutum. (v. s. sp. et v. c.)

5. A. NIGRICANS (Poir. voy. 2. p. 228. Desf. fl. atl. 2. p. 236), inferne subglabrata, apice pubes brevi tomentosa et pilis glandulosis hispida, foliis infer. pinnatifidis lyratisve lobis linear-lanceolatis subintegris, super. linearibus sessilibus integrerrimis, capit. confertè corymbosis, invol. pilis nigricantibus apice glandulosis confertè hispidis. (2) in Barbariæ propè Lacalle. A. corymbosa Brot. fl. lus.? ex Siend. Affinis ex involucro A. pinnatifidæ, sed foliis facile differt. (v. s.)
6. A. DENTATA (Sibth. fl. græc. t. 811. ined. ex prodr. 2. p. 240), pubes molli brevi (junior?) tomentosa, pilis nigris rigidis eglandulosis secùs pedicellos et involucra hispida, caule erecto ramoso, foliis caulinis elongatis plerisque pinnatifidis, capitulis parvis vix corymbosis. (2) in insulâ Milo legit Sibthorp, et semina ad cl. L'Herit. misit. Specimen meum cultum est glabriuscule, sed pilis invol. et pedic. rigidis nigris à cæteris differt, sed cum A. nigricante ultius comparandum. (v. s.)
7. A. TENUIFOLIA; pubes brevi molli plus minus canescens, foliis lanceolatis subdentatis acuminatis, capitulis racemoso-corymbosis, invol. præter pubem mollem pilos apice nigro-glandulosos gerente, achæniis striatis. (1) in arvis Siciliæ propè Panormum. (Tin. Guss.!), in arenosis maritimis inter Agosto et Syracusam (Splitb.!). Rothia tenuifolia Tineo cat. h. panorm. 1807. p. 280. Variat caule unico erecto aut plurimis adscendentibus, pubes parciore aut subtomentosâ. (v. s.)

Æ. lyrata (Guss. in litt.), foliis lyrato-pinnatifidis supremisque pilis glanduliferis hispidis, capitulis laxè racemosis majoribus. (1) in insulâ Pantelaria. An spec. fortè distinguenda? (v. s.)

γ. arenaria, densius tomentoso-canescens ad apicem pilis longis glandulosis subhispida, caule erecto, capitulis paucis. (1) in arenis maritimis circa Gibraltariam legit cl. Boissier. Capitula minora quam var. *β.* (v. s. comm. à cl. inv.)

Sect. II. VOIGTIA Roth in Rœm. et Ust. mag. 9. p. 17. non Spreng.
— Rothia Schreb. gen. n. 1241. non Pers. nec Lam.

Recept. margine paleaceum, paleis involucro brevioribus subhyalinis. — Achænia radii à plurimis dicuntur calva, sed papposa semper vidi. Fortè ob pappum deciduum achænia visa fuerunt nuda. Fortè interdùm reverâ ob palcarum pressionem calva?

8. A. ROTHLA (Pers. ench. 2. p. 378. n. 6), pubes molli tomentosa, ad apicem sumnum pilos glandulosos intermixtos gerens, caule basi ramoso diffuso, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis amplexicaulibus, capitulis corymbosis. (1) in Hispaniâ (Roth.). Voigtia tomentosa Roth in Art. mag. 10. p. 17. Rothia andryaloïdes Roth cat. bot. 1. p. 104. Gærtn. fr. 2. p. 371. t. 174. Willd. sp. 3. p. 1611. Achænia radii ut disci papposa intense striata. Paleæ in ambitu recept. 2-3-ser. parvæ ex Gærtn. (v. s. c.)

9. A. VARIA (Lowe! in litt. 1832), pubes molli plus minus tomentosa, pilis apice glandulosis secùs caulem et in foliis summis et involucris intermixtis, caulo erecto apice ramoso, foliis elongatis, radicalibus sèpius sinuatis, caulinis semi-amplexicaulibus sessilibusve, capitulis corymboso-paniculatis. *γ.* in Maderâ. Recept. paleæ 2-3-serialis in ambitu recept. hyalinæ acuminatæ. Achænia striata omnia papposa. Suadente cl. Lowe hoc var. seqq. collegi!

α. candidissima, tota tomento conferto incana, pilis glandulosis in caule involucrisque numerosis, foliis semiamplexicaulibus lato-lanceolatis integerrimis. — patr. ign. Andr. candidissima Desf. cat. h. par. ed. 3. p. 399. Cass. dict. 46. p. 312. (v. v. et s.)

β. angustifolia, tota tomento conferto incana, pilis glandulosis in caule,