dicellatis, involucro glabro 1-seriali brevissimè calyculato. ♃ in Unalaschka (Cham.), in Sitcha (h. ac. petrop.). Sonchus hastatus Less. in Linnæa 1831. p. 99. non Wall. (v. s. comm. ab ill. acad. sc. petrop.)

21. M. MACRANTHUM (Royle illustr. t. 61. f. 1). glabrum, radice grossâ, caulibus plurimis adscendentibus, foliis caulinis amplexicaulibus oblongis obtusis sinuato-dentatis, capitulis pedicellatis subcorymbosis, involucro breviter calyculato. ♃ in Indiâ boreali occid. Cor. cæruleæ. Achænium brevissimè rostratum. Icon sola prodiit. †.

22. M.? LESSERTIANUM, caule glabro erecto simplici, foliis subintegerrimis lanceolatis, inferioribus basi attenuatis superioribus semiamplexicaulibus, involucro hispido subimbricato. — in Indiæ orient. montanis ad Kamaon et Emodum legit cl. Wallich. Hieracium Lessertianum Wall.! cat. comp. n. 364. Sonchi sp. Froel. in litt. Certè non Hieracii sp. fortè genus proprium Mosn. in h. DC. Achænia oblonga compressa striata in rostrum crassum longiusculum producta. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

β. *denticulatum*, radice tuberosâ, foliis denticulatis, racemo secundo. — in Indiæ or. prov. boreali-occid. legit cl. Royle! Fortè species distincta et cum var. α genus sectionemve constituens. (v. s. comm. à cl. inv.)

DCCCXLV. ANISORAMPHUS.

Capit. multiflorum. Involucrum calyculato-imbricatum, squamis lato-linearibus, exter. circ. 2-serialibus brevibus, inter. subbiserialibus elongatis. Receptaculum epaleaceum. Achænia oblonga (ex immaturo statu) compressa striata rostrata, rostro exteriorum brevi, interiorum longiori. Pappus pilosus multiserialis subochroleucus. — Herba Capensis perennis habitu Hieracii aut Hypochæridis. Radix crassa cylindracea. Folia radicalia oblonga basi subattenuata subretrorsùm dentata glabra, caulina paucissima linearia integerrima. Caulis subnudus basi sulcatus glabriusculus, apice parcè ramosus circ. 3-cephalus pilis rigidis nigris hirtus. Involucrum squamæ pilis iisdem confertioribus hirtæ. Flores lutei.

1. A. HYPOCHÆRIDEUS. ♃ ad Cap. Bonæ-Spei, ad Zwart Klipplatrivier et Zwart Kay legit cl. Drege! Herba circ. pedalis. (v. s. comm. à cl. inv.)

DCCCXLVI. PICROSIA *Don trans. soc. linn. 16. p. 183. Less. syn. 143.*

Capitulum multiflorum. Involucrum 1-seriale 8-phyllum. Receptaculum nudum. Achænia longè rostrata, imò rostro breviora, fusiformia, longitudinaliter sulcata. Pappus pilosus mollis (?) caducus biserialis scabriusculus inæqualis, cinereo-fulvus ex Don. — Herba Brasiliensis erecta lævigata glauca parcè ramosa. Folia caulina semiamplexicaulia lanceolata integerrima aut vix subdentata. Pedunculi nudi 1-cephali. Flores lutei involucro longiores, ligulæ 4-nerviæ. Pappus in meo specim. fortè non satis adulto albus.

1. P. LONGIFOLIA (Don l. c.). ♃ in Alpibus Peruviæ (R. et Pav.), in Brasiliâ (Sellow!), in humidis circà Buenos-Ayres et Mendozam (H. et Arn. comp. 1. p. 32). Troximon fritillarioides Less. syn. 143. (v. s. comm. è mus. reg. berol.)

DCCCXLVII. TROXIMON *Gærtn. fr. 2. p. 360? Nutt. gen. am. 2. p. 127. Sprengel. syst. 3. p. 633. Hook. fl. bor. am. 1. p. 300 non Raf.* — Agoseris *Raf. fl. ludov. p. 88.*

Capit. multiflorum. Involucrum imbricatum subconicum, squamis latis extùs plùs minùs villosiusculis. Receptaculum epaleaceum. Achænia teretius-