

4. *L. palustris* *Smith.*

In pascuis humidis : *Fusaro.*

5. *L. taraxacoides*. *Hoppe.*

In pascuis montosis : *Cerealto*, *Bagnuli* (Guss.): *Majella.*

Obs. A *L. alpino* foliorum lacinia extima parabolica nec triangulari statim dignoscitur.

6. *L. glaucescens* *M. B.*

In pascuis alpinis cum *L. apennino*.

7. *L. bulbosus* Lin. *Hieracium bulbosum*. Will.

In umbrosis humentibus : *Falde di Monte nuovo*, *Valle di S. Rocco*, *Pozzelle*, *Camaldoli*, et alibi.

* 1. *Apargia autumnalis*.

In pratis montanis Aprutii : *Ovindoli*, *Rocca di mezzo*.

* 2. *A. saxatilis*; scapo basi subramoso subfolioso, calyceque hispido, folis pinnatifido-dentatis, laciniis divergentibus integrerrimis hispidis pilis furcatis, pappo substipitato. *Ten. Fl. nap. prodr.* p. 46. *Synopsis*, in *Catal. H. R. N. edit. 1.* pag. 67. et *edit. 2.* pag. 59. *Fl. nap. tom. 2.* pag. 168. *tav. 72.* *Hieracium alterum saxatile montanum*. *Colum. Ecphr. 1.* p. 244. *tab. 243.*

— — *A. scapo ramoso*.

— — *B. scapo indiviso*, foliorum laciniis plerumque elongatis *A. hispanica*, Lang. pl. exsicc. ex agro ruthenico Centur. 2. n. 101.

Inter saxorum rimas, in montibus insulae Caprearum, Stabium, Aprutii etc.

— — *B. in Gargano*. Perennis.

Obs. Ab *A. hispida* differt foliorum dentibus vel laciniis valde remotis, plantae canescens, anthodio basi aucto squamis elongatis patulis, radice caulescente lignosa ramentis petiolorum emarcidis undique tecta.

* 3. *A. hispida*.

In herbidis apricis montosis Hirpinorum : *Bagnuli* (Guss.). Apulia : *Murgie*; Aprutii : *Colli*, *Majella*.

Obs. Folia viridia lanceolata, crebre dentata dentibus brevibus triangularibus erectis, scapus glabriusculus, anthodium lanatum.

4. *A. crispa.*

— — *A. macrorrhiza*; humilis, foliis pinnatifidis hirtis, laciniis acutis angustissimis dentatis, scapo-anthodioque glabriusculo. An *A. macrorrhiza* Güntheri, ex Spreng. *System. vegetab.* 3. pag. 665? sed in nostra pili passim trifurcati non omnes simplices.

— — *B. Elata*; foliis runcinato-pinnatifidis, laciniis remotis dentatis.

In pascuis montium Aprutii; *A. Velino*, *B. Majella*, *Monte Corno*.

* 5. *A. cichoracea*; scapo squamoso 1-floro glabro, foliis obovatis dentato-runcinatis glabriusculis, petiolis hirtis pilis furcatis simplicibusque, calycinis squamis acutis hirtis, radice tuberoso-fasciculata. *Ten. Fl. nap. prodr.* p. 46. (1811) et *Fl. nap. II.* pag. 166. tav. 71. *A. fasciculata*. *Biv. Stirp. rar. manip.* 2. tab. 2. (1814) et *Spr. Syst. veg.* 3. pag. 664.

In pascuis montosis: *M. S. Angiolo di Castellammare al Piano di Faito*, *Pollino*, *Ruggia*, *Martina*, *Ginosa*; *Monti di Abruzzo*, Perennis.

6. *A. incana* Scop. *Gargano*.

* 7. *A. alpina*.

In editioribus montibus Aprutii: *M. Corno*, *Majella*.

8. *A. aurantiaca* Kit. non *A. aurea* Willd.

In glareosis alpinis Aprutii: *Costone* (Guss.): *M. Corno*, *M. Amaro*, *Majella*, *Focaleto*, *Velino*.

Obs. Scapus depresso flexuosus, folia angustissima.

9. *A. Rosani*; scapo nudo unifloro glabriusculo prope florem hispido, foliis runcinato-pinnatifidis hispidis lobis remotissimis, terminali triangulari-hastato pilis glochidiatis, calycibus hispidis, radice fibrosa. *Ten. Ind. Sem. H. R. Neap.* pro 1825 (in notis) pag. 11. Ad *Fl. neap. prodr.* app. V. p. 26.